


Catálogo GANADERÍA



MEDIVEB

Medicinas Veterinarias



KUBUS



zoomevet





zoomvet

IVERMECZOO 3.15%



Ivermectina al 3.15%

Endectocida para el control de parásitos interno y externos

Ivermeczoo 3.15% es un desparasitante indicado para el tratamiento y control de nematodosis gastrointestinal y pulmonar, sarna, parasitosis externas, hipodermosis (Nuche, Tórsalo).

Actúa en el tratamiento y control de las formas adultas e inmaduras de nematodos gastrointestinales y pulmonares, nuches (los tres estadios parasitarios), piojos chupadores, ácaros de la sarna psoróptica, coriódptica y sarcóptica, larvas de moscas parasitarias y también como coadyuvante en el control de piojos masticadores y garrapatas tropicales *Rhipicephalus (Boophilus) spp.*

Dosis y administración:

Vía de administración recomendada:

Aplicar sólo por vía subcutánea, agitando vigorosamente por 30 segundos antes de aplicarlo.

Bovinos, bufalinos, ovinos y caprinos:

Se recomienda a razón de 1 ml por cada 50 k.p.v.

Porcinos:

Se recomienda a razón de 1 ml por 33 k.p.v.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contienen:

Ivermectina.....	3.15g
Excipientes c.s.p.....	100 ml



Presentación: 500ml



MULTIVIT ZOO

multivitamínico inyectable

Multivit Zoo está recomendado como promotor de crecimiento, energizante, reconstituyente en animales de producción y con procesos carenciales (nutricionales, anemias y parasitosis).



Presentación: 250 ml



Dosis y administración:

Vía de administración recomendada:
Intramuscular o subcutánea.

Bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos:
1 ml por 50 k.p.v. cada 15 días durante 2 a 3 meses.
Caninos: 0,1 ml por 5 k.p.v.
Aves: 0,1 ml.

Composición:

Cada 100 ml contienen:

DL-Metionina.....	210 mg
L-Arginina.....	200 mg
L-Histidina.....	210 mg
L-Leucina.....	210 mg
L-Lisina.....	1000 mg
L-Treonina.....	100 mg
L-Triptófano.....	50 mg
L-Valina.....	200 mg
Glutamato de Sodio.....	420 mg
ATP.....	300 mg
Vitamina A Palmitato.....	3000000 UI
Cianocobalamina (Vit B12).....	5 mg
Colecalciferol (Vit D3).....	1000000 UI
Alfa-Tocoferol Acetato (Vit E).....	1000 mg
Citrato de Hierro Amoniacal.....	400 mg
Cloruro de Sodio.....	42 mg
Glicerofosfato de Sodio.....	1000 mg
Gluconato de Calcio.....	3.80 mg
Gluconato de Cobalto.....	20.10 mg
Gluconato de Magnesio.....	410 mg
Gluconato de Manganeso.....	318.70 mg
Gluconato de Zinc.....	167.20 mg
Selenito de Sodio.....	50 mg
Yoduro de Potasio.....	200 mg
Excipientes c.s.p.....	100 ml

OXI ZOO L.A.

Oxitetraciclina 200mg/ml
Antibiótico de amplio espectro

Oxi Zoo L.A. es un antibiótico utilizado en infecciones sistémicas y locales, bronconeumonías, mastitis, enteritis bacteriana, artritis, osteoartritis, infecciones del tracto urinario, prostatitis, pododermatitis, queratoconjuntivitis, clamidiosis, anaplasmosis, carbón, rinitis atrófica, leptospirosis, pasteurellosis, actinomicosis, actinobacilosis, nocardiosis, eperythrozoonosis y haemobartonelosis entre otras.

Dosis y administración:

Bovinos, porcinos, ovinos:

Vía intramuscular profunda o subcutánea.
1 ml por 10 k.p.v. (20 mg/k.p.v.).

Aves:

Vía subcutánea.
0,25 ml por k.p.v. (correspondiente a 50 mg/k.p.v.).

En animales menores de 1 Kg de peso deberán aplicarse 0,25 ml totales o a criterio del M.V.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contienen:

Oxitetraciclina (dihidrato).....	20 g
Excipientes c.s.p.....	100 ml



Presentación: 250 ml



ZOOGEL



Ungüento de mentol y alcanfor

Zoogel es un ungüento antiflogístico y coadyuvante en el tratamiento de lesiones musculares, contusiones, reumatismos, maduración de abscesos e inflamaciones localizadas.

Indicaciones:

Este medicamento es de aplicación tópica directamente sobre la piel. Colocar una pequeña cantidad del producto sobre la zona afectada, frote suavemente y a fondo. No usar más de 4 veces al día.

Especies de destino: Equinos, bovinos, caprinos, ovinos y porcinos.




Presentación: 200 g

Composición:

Cada 100 g contienen:

Alcanfor.....	3 g
Aceite de trementina.....	1.5 g
Salicilato de metilo.....	3.5 g
Lanolina.....	4 g
Excipientes c.s.p.....	100 g





CHINFIELD

AMINOÁCIDOS VIT

BENEFICIOS:

Aminoácidos Vit aporta los aminoácidos esenciales para mantener o restaurar el nivel proteico adecuado, las vitaminas indispensables para el aprovechamiento de los mismos y los electrolitos necesarios para asegurar la isotonía.

INDICACIONES:

Deshidratación de cualquier origen (diarreas, poliuria, hepatopatías, sudoración intensa), intoxicaciones, estados de agotamiento físico, estado de estrés, hemorragias, pérdida de electrolitos, hipoproteinemias, convalecencias, inapetencia y sobreentrenamiento.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Equinos:

Inyección endovenosa LENTA: 0,1 a 0,5 ml por cada kg P.V.

Oral: 0,15 a 0,7 ml por cada kg P.V.

Bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos y porcinos:

Inyección endovenosa lenta, intramuscular o subcutánea:

0,1 a 0,5 ml por cada kg P.V.

Oral: Hasta 2 meses de edad.

0,15 a 0,7 ml por cada kg P.V.

Caninos y felinos:

Inyección endovenosa lenta, intramuscular o subcutánea:

0,1 a 0,3 ml por cada kg P.V.

Oral: 0,15 a 0,4 ml por cada kg P.V.

Intervalo entre dosis para todas las especies:

Según criterio del Médico Veterinario.

FÓRMULA:

Arginina.....	300 mg	Pantotenato de Calcio.....	1000 mg
Fenilalanina.....	100 mg	Vitamina B1 (clorhidrato).....	50 mg
Histidina clorhidrato.....	50 mg	Vitamina B2 (fosfato).....	10 mg
Leucina.....	75 mg	Vitamina B6 (clorhidrato).....	25 mg
Triptófano.....	50 mg	Vitamina B12.....	1.000 ug
Treonina.....	50 mg	Vitamina C.....	300 mg
Valina.....	100 mg	Cloruro Sodio.....	900 mg
Cisteína (clorhidrato).....	100 mg	Cloruro potasio.....	100 mg
Lisina (clorhidrato).....	500 mg	Cloruro de magnesio.....	50 mg
Glicocola.....	1000 mg	Cloruro de cobalto.....	10 mg
Metionina.....	400 mg	Citrato de sodio.....	100 mg
Nicotinamida.....	200 mg	Sorbitol.....	5000 mg
		Agentes de formulación c.s.p.....	100 ml



Presentación: 250 ml

ANTIHIISTAMÍNICO

BENEFICIOS:

Los procesos alérgicos afectan a los diferentes órganos y tejidos y se manifiestan con la sintomatología más variada, que puede ir desde una simple dermatopatía hasta el shock mortal.

Antihistamínico Chinfield tiene como principio activo un antihistamínico potente y de amplio espectro, efectivo para reducir y eliminar cualquier reacción alérgica. También tiene acción preventiva, por lo cual es aconsejable su uso cuando se prevé una reacción de este tipo. Administrado en las dosis que se indica, **Antihistamínico Chinfield** es inocuo y casi por completo carente de reacciones secundarias, lo que permite su uso cada vez que sea necesario.

INDICACIONES:

Procesos alérgicos de cualquier etiología y localización y en todos los casos en que está indicada una medicación antihistamínica.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Equinos, bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos y porcinos: 1 a 2 ml por cada 100 kg P.V., cada 6, 8, 12 o 24 hrs según recomendación del Médico Veterinario.

Caninos y felinos:

0.2 a 0.4 ml por cada kg P.V.

Caninos: cada 8, 12 o 24 hrs según la recomendación del Médico Veterinario.

Felinos: cada 12 o 24 hrs según la recomendación del Médico Veterinario.

Vía endovenosa o intramuscular según la urgencia y recomendación del Médico Veterinario.

FÓRMULA:

Clorhidrato de Difenhidramina1000 mg
Agentes de formulación c.s.p.100 ml



Presentación: 50 ml

AMINOSUC

BENEFICIOS:

Aminosuc es una asociación de vitaminas y minerales esenciales integrados con aminoácidos, que constituyen un suplemento alimenticio, especialmente adaptado para complementar la ración del animal. Su administración durante 10 días consecutivos, garantiza un perfecto equilibrio alimenticio, que suple todas las exigencias dietéticas del animal y le permite aprovechar al máximo el valor calórico y de reposición de la ración.

INDICACIONES:

Hipovitaminosis, pérdida de peso, animales en crecimiento, raquitismo, convalecencia, entrenamiento, animales físicamente disminuidos por edad, enfermedad, preñez y lactancia. Para llevar al animal a óptimas condiciones de rendimiento y salud.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Equinos y bovinos: Suministrar 10 ml por cada 100 kg P.V. o 1 ml por cada 10 kg P.V. una o dos veces por día directamente en la boca, durante 10 días seguidos y 20 días de descanso según el requerimiento del animal o indicación del Médico Veterinario. En animales muy disminuidos, administrar durante 20 a 30 días seguidos.

Porcinos, caprinos, ovinos, aves, caninos y felinos: 1 ml por cada 10 kg P.V. 1 o 2 veces por día directamente en la boca, durante 10 días seguidos y 20 días de descanso según el requerimiento del animal o indicación del Médico Veterinario. En animales muy disminuidos, administrar durante 20 a 30 días seguidos.

FÓRMULA:

Vitamina A.....	150000 UI
Vitamina B1 clorhidrato.....	750 mg
Vitamina B2 fosfato.....	150 mg
Vitamina B6 clorhidrato.....	120 mg
Vitamina B12.....	5000 ug
Vitamina B13.....	75 mg
Vitamina B15.....	10 mg
Vitamina C.....	5000 mg
Vitamina D2.....	200000 UI
Vitamina E.....	150 mg
Vitamina H.....	1 mg
Nicotinamida.....	500 mg
Pantotenato de Calcio.....	150 mg
Acido Fólico.....	5 mg

Aminoácidos (caseína).....	20.000 mg
Metionina.....	500 mg
Lisina.....	500 mg
Fosfato Tricálcico.....	20.000 mg
Hidróxido de Magnesio.....	10.000 mg
Sulfato Ferroso.....	2.000 mg
Cloruro de Cobalto.....	150 mg
Sulfato de Cobre .5H2O.....	75 mg
Sulfato de Manganese.....	100 mg
Sulfato de Zinc.....	50 mg
Ioduro de Potasio.....	750 mg
Cloruro de Sodio.....	5.000 mg
Lecitina.....	5.000 mg
Agentes de formulación c.s.p.....	1.000 ml



AGITAR ANTES DE USAR

Presentación: 1000 ml y 120 ml

B-12 50.000 mcg

BENEFICIOS

La vitamina B12 es un potente antianémico que actúa aumentando el número de glóbulos rojos hasta el valor normal. Es un neurotónico muy efectivo que contribuye a la solución de problemas de neuritis, neuralgias, mialgias y otros trastornos neurológicos. Estas cualidades lo hacen muy eficiente en la recuperación de animales sometidos a sobreentrenamiento, convalecientes de enfermedades orgánicas, infecciosas o parasitarias.

INDICACIONES:

Anemias de cualquier tipo (disminución del número de glóbulos rojos), procesos neurológicos (neuralgias y neuritis), convalecencias, debilidad, tónico inespecífico para ayudar a la recuperación de animales decaídos.

ESPECIES:

Equinos, bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar 0,5 ml a 1 ml por cada 50 k.p.v. cada 48 hrs o según indicación del Médico Veterinario.
Inyección intramuscular o endovenosa LENTA.

Efectos adversos y contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto.

No presenta efectos adversos usando la dosis recomendada.

FÓRMULA

Vitamina B12 (cianocobalamina).....50000 mcg
Agentes de formulación c.s.p.....50 ml



Presentación: 50 ml

CIPROHEPTADINA

BENEFICIOS

Ciproheptadina Chinfield es un jarabe que aumenta el apetito, favorece el desarrollo muscular, estimula la función hepática y la secreción de los jugos digestivos actuando como tónico general. Levanta en breve tiempo animales caídos, debilitados o convalecientes. No interfiere con otros tratamientos y está indicado cuando se administran vitaminas, hepatoprotectores y antianémicos.

INDICACIONES:

Estimulante del apetito, indicado en anorexia, avitaminosis, pérdida de peso, falta de desarrollo, inapetencias, convalecencias y debilidad muscular.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equinos, bovinos: Vía oral, 10 ml por cada 100 kg P.V.

Caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos, aves y conejos: Vía oral, 1 ml por cada 10 kg P.V.

Se recomienda administrar 2 horas antes de la ración, puro, directamente en la boca, durante 20 días consecutivos o según indicación del Médico Veterinario.

Refrigerar después de abierto.

FÓRMULA

Cada 1000 ml contiene:

Ciproheptadina (clorhidrato).....	1g
Lisina (clorhidrato).....	100 g
Betaína (clorhidrato).....	30 g
Vitamina B12.....	20 mg
Agentes de formulación c.s.p.....	1000 ml



Presentación: 1000 ml y 100 ml

COAGULANTE

BENEFICIOS

Coagulante Chinfield cubre todo el cuadro de hemorragias de cualquier etiología y localización, gracias a los dos componentes activos de su formulación. Se administra cuando se produce un derrame sanguíneo, se obtiene rápidamente la detención completa de la efusión hemática y si se administra preventivamente, se consigue evitar la pérdida de sangre.

Al inyectarlo una hora antes de cualquier intervención quirúrgica, se tendrá un campo operatorio más claro y se facilita de esta manera la maniobra operatoria. La vitamina K por su inherencia en la formación de protrombina, y la ciclonamina acelerando la transformación de protrombina en trombina, prolonga significativamente el tiempo de actividad del producto.

INDICACIONES:

Prevención y tratamiento de hemorragias de cualquier etiología y localización.



Presentación: 10 ml

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equino – Bovinos: 2 a 4 ml por cada 100 k.p.v. o según criterio del Médico Veterinario.

Caninos – Felinos: 0,25 a 1,5 ml por cada 100 k.p.v. según el tamaño del animal o según criterio del Médico Veterinario.

Repetir 1 o 2 veces por día hasta que cese la hemorragia.

Inyección Endovenosa LENTA o Intramuscular LENTA.

Intervalo entre dosis: Mínimo 12 horas o según criterio del Médico Veterinario.

Efectos adversos y contraindicaciones:

En caso de inyección endovenosa rápida puede producir leve hipotensión transitoria. Si se produjeran coágulos intravasculares, utilizar drogas como sulfonilureas (tolbutamida, clorpropamida), a efectos de mejorar la actividad fibrinolítica.

ANTAGONISTAS FARMACOLÓGICOS:

Cumarina y warfarina.

Precauciones:

Condiciones de asepsia y antisepsia para inyección parenteral.

No mezclar con otros productos en la misma jeringa.

No exceder los 10 ml por punto de aplicación intramuscular, en estos casos, repartir en dos lugares.

FÓRMULA

Ciclonamina.....	15 g
Vitamina K1.....	50 mg
Agentes de formulación c.s.p.....	100 ml

DIURETIC

BENEFICIOS

Existe una entidad fisiopatológica caracterizada por la retención de agua en distintos tejidos, el edema, cuya medicación de fondo se basa fundamentalmente en la eliminación de ese exceso de agua, por vía renal mediante fármacos que aumenten la diuresis, los denominados diuréticos. **Diuretic** aumenta significativamente la eliminación de agua por vía renal (acción renotrópica) y lo que es más importante para el tratamiento del edema, la eliminación de sodio por la misma vía, ya que el agua le sigue pasivamente por acción osmótica. **Diuretic** es uno de los diuréticos-saluréticos más potentes. Con su administración se logra eliminar en breve tiempo el edema y sus efectos concomitantes, manteniendo en un nivel bajo la eliminación de potasio. La potente actividad de este fármaco permite manejar la diuresis en la forma necesaria, adecuando la dosis a administrar según lo aconseje la gravedad y evolución de la enfermedad.



Presentación: 10 ml

INDICACIONES:

Edemas de cualquier etiología y localización: de ubre pre y postparto, renal, cerebral, cardíaco, pulmonar, por obstrucción vascular, hipertensión arterial, hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio (HPIE).

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos, felinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Administrar por inyección endovenosa o intramuscular según necesidad o urgencia.

Equinos y Bovinos:

0,4 a 1,2 ml por cada 100 k.p.v. (20 a 60 mg de furosemida).

Caninos y Felinos: 0,04 a 0,1 ml por cada k.p.v. (2 a 5 mg de furosemida).

1 a 3 veces por día, según criterio del Médico Veterinario.

Incompatibilidades:

Anfotericina B: Su uso conjunto puede producir hipopotasemia.

Glucósidos Digitálicos: Puede aumentar la posibilidad de intoxicación digitálica asociada a hipopotasemia.

Acido Acetilsalicílico: En casos de hipoprotobinemia.

Teofilina: Por potenciación de su efecto.

Fenilbutazona: Disminución del efecto diurético por inhibición de prostaglandina de origen renal.

SOBREDOSIFICACION:

En caso de una sobredosificación accidental, suspender la administración del fármaco y reestablecer el equilibrio hidroelectrolítico inmediatamente.

DL 50 en perros 400 mg por cada k.p.v. por vía endovenosa.

FÓRMULA

Furosemida.....5000 mg
Excipientes c.s.p.....100 ml

FUROFIELD

BENEFICIOS

La furosemida aumenta significativamente la eliminación de agua por vía renal (acción renotrópica) y lo que es más importante para el tratamiento del edema, la eliminación de sodio por la misma vía, ya que el agua le sigue pasivamente por acción osmótica. Con su administración se logra eliminar en breve tiempo el edema y sus efectos concomitantes, manteniendo en un nivel bajo la eliminación de potasio. La potente actividad de este fármaco permite manejar la diuresis en la forma necesaria, adecuando la dosis a administrar según lo aconseje la gravedad y evolución de la enfermedad.

Diurético y anti-inflamatorio que promueve la excreción del cloro y potasio. Su efecto diurético es independiente del estado de equilibrio ácido básico del paciente. La dexametasona posee una actividad antiinflamatoria y antiestrés. La experiencia clínica demuestra que los edemas se ven notablemente disminuidos por este fármaco.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equinos, Bovinos, Ovinos y Caprinos: 2 a 5 ml por cada 100 k.p.v. cada 24 horas o a criterio del Médico Veterinario.
Caninos y Felinos: 0,25 a 0,5 ml por cada 5 k.p.v. con intervalo entre dosis de 12 o 24 horas o según criterio del Médico Veterinario.

El producto se aplicará en las dosis indicadas, por vía endovenosa LENTA o intramuscular.

Efectos adversos y contraindicaciones:

No aplicar en caso de infecciones sistémicas agudas (a menos que esté instaurada terapia antimicrobiana específica). Evitar vacunas de organismos atenuados. Tampoco debe utilizarse en pacientes con tuberculosis activa o dudosamente inactiva exceptuando cuando se utiliza en conjunción con drogas tuberculostáticas. No sobredosificar para evitar desequilibrios electrolíticos producidos por furosemida. No administrar a animales con trastornos renales agudos. No administrar a hembras en su tercer trimestre de gestación por la presencia de dexametasona que podría provocar inducción al parto prematuro no deseado. Un tratamiento prolongado puede provocar hipercorticismismo, así como la suspensión brusca del fármaco podría provocar hipocorticismismo.

INTERACCIONES:

Anfotericina B diuréticos depletors de Potasio: Su uso conjunto puede producir hipopotasemia.

Glucósidos Digitálicos: Puede aumentar la posibilidad de intoxicación digitálica asociada a hipopotasemia.

Acido Acetilsalicílico: En casos de hipoprotinemia.

Teofilina: Por potenciación de su efecto.

Fenilbutazona: Disminución del efecto diurético por inhibición de prostaglandina de origen renal.

Isoniazida: Su efectividad antituberculosa puede disminuir por aumento del metabolismo hepático.

FÓRMULA

Furosemida.....5 g
 Dexametasona 21 fosfato.....0,2 g
 Agentes de formulación c.s.p.....100 ml



Presentación: 25 ml

GASINT

BENEFICIOS

Gasint disminuye la tensión superficial del contenido gastroentérico, de esta manera los gases formados se reúnen en burbujas grandes y son fácilmente expulsados. Puede ser empleado en el pre y post-operatorio en forma preventiva para eliminar la formación de gases o cuando aparecen los primeros síntomas de distensión abdominal o cólico.

INDICACIONES:

Sirve para trastornos gaseosos como meteorismos o timpanismos, producción y retención de gases en todo el tracto gastroentérico, pre y post-operatorio abdominal, acetonemias, previene lesiones e insuficiencias hepáticas como consecuencia de intoxicaciones alimentarias.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, ovinos y caprinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equinos y Bovinos: 100 ml en el momento en que empiezan las molestias. Si es necesario, repetir dosis cada 2 a 4 horas. Como profiláctico en pre-operatorio, aplicar 100 ml 8 horas antes de la operación.

Ovinos y Caprinos:

Animales pequeños: 10 a 20 ml.

Animales grandes: 40 a 50 ml.

Exclusivamente inyección endovenosa RÁPIDA.

FÓRMULA

Sorbitol.....50 g
Agentes de formulación c.s.p.....100 ml

Efectos adversos y contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto.
No usar en los casos de enfermedades hepáticas severas, insuficiencias cardíacas o renales, deshidratación y diarrea.
No se han observado efectos adversos si se administran en forma indicada. En caso de sobredosis administrar Atropina.



Presentación: 100 ml

HEMOFIELD

BENEFICIOS

Hemofield es un antianémico y antineurítico eficaz para lograr rápida recuperación en anemias no ferropénicas. La eficiente combinación en su fórmula del ácido fólico, fundamental en la síntesis del ácido desoxirribonucleico y por lo tanto de la eritropoyesis lo que lo convierte en un factor esencial de crecimiento y maduración eritrocítica, junto a vitamina B12, la vitamina "antianémica" y vitamina B1, la vitamina antineurítica por excelencia, hacen de **Hemofield** la elección cuando baja el rendimiento del animal sin causas aparentes que lo justifiquen, cuando se sospecha sobreentrenamiento o cuando el hemograma arroja valores subnormales en el recuento de glóbulos rojos.

INDICACIONES:

Animales expuestos a enfermedades infecciosas o parasitarias anemizantes.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, caprinos, ovinos y caninos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equinos y bovinos en crecimiento:

2,5 ml por cada 100 k.p.v. diarios.

Equinos y bovinos adultos: 10 ml diarios.

Caninos, caprinos y ovinos:

1 ml por cada 25 k.p.v. diarios.

Aplicar por vía endovenosa LENTA (de elección). También se puede aplicar por vía intramuscular.

FÓRMULA

Ácido Fólico.....	0,1 g
Vitamina B1.....	10 g
Vitamina B12.....	0,2 g
Agentes de formulación c.s.p.....	100 ml



Presentación: 50 ml

HEPATOFIELD

BENEFICIOS

Los equinos, son animales expuestos a alto nivel de estrés por el exigente entrenamiento al que son sometidos. Por su casi permanente encierro y por los diferentes tratamientos que reciben, frecuentemente dan como resultado problemas hepáticos de tipo colestático debido a obstrucciones del drenaje biliar, congestiones e inflamaciones intestinales, cólicos e intoxicaciones de origen exógeno o endógeno.

El síndrome de colestasis se manifiesta en los equinos deportivos por alteraciones como anorexia, pérdida de peso, trastornos cutáneos, constipación, halitosis, putrefacciones intestinales, timpanismos cecocólicos y flatulencias, que de no ser adecuadamente tratadas generan una astenia que determina una importante merma del rendimiento del equino.

Hepatofield ha demostrado, en las numerosas pruebas efectuadas con equinos, una elevada eficacia para resolver los problemas de colestasis en el 92% de los casos, observándose una inmediata y completa remisión clínica de los signos, a no más de 5 días de iniciado el tratamiento.

INDICACIONES:

Desintoxicante hepático oral, indicado en insuficiencia hepática intoxicaciones medicamentosas, falta de apetito, sobreentrenamiento y activación de la función hepática.

ESPECIES:

Equinos deportivos y de trabajo no destinados al consumo humano.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

Grandes animales: Administrar 25 ml 1 o 2 veces al día, durante 10 días consecutivos.

Pequeños animales: Administrar 0.5 ml por cada 10 kg P.V. 1 o 2 veces al día, durante 10 días consecutivos.

La duración del tratamiento puede continuarse hasta 4 semanas, según necesidad e indicación del Médico Veterinario.

AGITAR ANTES DE USAR.

Efectos adversos y contraindicaciones:

Puede producir ablandamiento excesivo de las heces, en cuyo caso con la sola suspensión del producto recuperan su consistencia normal.

FÓRMULA

Tintura de alcachofa.....	40 ml
Tintura de boldo.....	40 ml
Tintura de carqueja.....	40 ml
DL Metionina.....	12 g
Sorbitol 70%.....	500 g
Agentes de formulación c.s.p.....	1000 ml



Presentación: 1000 ml y 100 ml



CHINFIELD

YODACALCIO B12 D

BENEFICIOS

Yodacalcio B12 D es una asociación de calcio con oligoelementos (cobre, cobalto, hierro, yodo y fósforo), vitamina D2 y B12 recomendados para el tratamiento de los estados carenciales del ganado bovino. También promueve la ganancia de peso, la resistencia a enfermedades, aumenta el porcentaje de preñez y favorece el crecimiento. Su composición tiene un alto impacto sobre la eficiencia del metabolismo intermedio favoreciendo al máximo el aprovechamiento de los nutrientes contenidos en la dieta del animal.

INDICACIONES:

Suplemento mineral vitamínico indicado cuando se necesite incrementar la provisión de minerales y vitaminas en casos de, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipotiroidismo, debilidad, paresia puerperal, disminución de fertilidad.

Coadyuvante en carencias minerales y vitamínicas durante: preñez, lactancia, crecimiento, engorde, convalecencias, pre-parto, pre-servicio, pre y post-destete. En coincidencia con desparasitaciones y vacunaciones. Disminuye la incidencia de retenciones placentarias.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar 1 a 2 ml por cada 50 k.p.v. podrá repetirse entre 15 y 45 días. De rutina se recomienda a intervalos de 30 días y en lo posible programar las aplicaciones estratégicamente. Inyección subcutánea, intramuscular o endovenosa LENTA.

Bovinos caídos por hipomagnesemia o hipocalcemia, aplicación endovenosa LENTA de hasta 50 ml por cada 100 k.p.v. o según criterio del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Gluconato de calcio.....	18,7 g
Hipofosfito de calcio.....	6 g
Edetato de sodio y cobalto.....	12,5 g
Edetato de sodio y cobre.....	15 g
Edetato de sodio y hierro.....	12,5 g
Edetato de sodio y manganeso.....	6,5 g
Edetato de sodio y zinc.....	1 g
Cloruro de magnesio.....	2,5 g
Ioduro de potasio.....	1 g
Vitamina B12.....	1500 UI
Vitamina D2.....	25000 UI
Agentes de formulación c.s.p.....	1000 ml



Presentación: 500 ml

CHINFIELD

YODACALCIO MG

BENEFICIOS

Importante aporte mineral para el normal funcionamiento de los distintos sistemas del organismo con oligoelementos esenciales, reforzado por una elevada concentración de magnesio, que lo hace un producto de elección en aquellas zonas en donde esta carencia adquiere particular importancia, sobre todo en los casos de manifestaciones agudas. Tiene un positivo impacto sobre el metabolismo intermedio favoreciendo al máximo el aprovechamiento de los nutrientes contenidos en la dieta. **Yodacalcio MG®** promueve la ganancia de peso, favorece los procesos reproductivos y el crecimiento.

INDICACIONES:

Suplemento mineral vitamínico indicado cuando se necesite incrementar la provisión de minerales y vitaminas en casos de hipomagnesemia, hipocalcemia, afeosforosis, hipotiroidismo, debilidad, paresia puerperal, disminución de fertilidad, coadyuvante en carencias minerales durante la preñez, lactancia, crecimiento, engorde, convalecencias, pre-parto y pre-servicio, pre y post-destete. En coincidencia con desparasitaciones y vacunaciones, previamente y durante el pastoreo, animales caídos por hipomagnesemia e hipocalcemia.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Bovinos: 2 a 4 ml por cada 100 k.p.v.

Porcinos: 1 a 2 ml por cada 20 k.p.v.

Ovinos: 1 a 2 ml por cada 20 k.p.v.

Caprinos: 1 a 2 ml por cada 20 k.p.v.

Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa LENTA. La dosis podrá repetirse entre 15 y 45 días, pero el intervalo podrá ser modificado según estado y criterio del Médico Veterinario. De rutina se recomienda intervalo de 30 días y en lo posible programar las aplicaciones estratégicamente.

Bovinos caídos por hipomagnesemia o hipocalcemia aplicación endovenosa LENTA de hasta 50 ml por cada 100 k.p.v. o según criterio del Médico Veterinario.

Equinos: 2 a 3 ml por cada 100 k.p.v. aplicar por vía endovenosa LENTA (de elección).

Intramuscular, repartida en dos lugares.

Equinos deportivos: dosificar cada 5 a 8 días.

Equinos de trabajo: podrá repetirse entre 15 y 45 días, pero el intervalo podrá ser modificado según estado y criterio del Médico Veterinario. De rutina se recomienda intervalo de 30 días y en lo posible programar las aplicaciones estratégicamente.



Presentación: 500 ml

FÓRMULA

Gluconato de calcio.....	18,70 g
Hipofosfito de calcio.....	6 g
Gluconato de magnesio.....	100 g
Cloruro de magnesio.....	2,50 g
Ioduro de potasio.....	1 g
Edetato de sodio y cobalto.....	2,40 g
Edetato de sodio y cobre.....	1,41 g
Edetato de sodio y hierro.....	1,21 g
Edetato de sodio y manganeso.....	0,22 g
Edetato de sodio y zinc.....	0,05 g
Vitamina B12.....	1500 ug
Vitamina D2.....	25000 UI
Agentes de formulación c.s.p.....	1000 ml

Virbac



Citius® 5%

Suspensión antibiótica sin tiempo de retiro en leche

Presentación: Frasco 100 ml

Virbac

En Cerdos:

Citius® 5% Es una suspensión antibiótica a base de Cefalosporina de nueva generación, inyectable de amplio espectro para su uso en porcinos para el tratamiento de enfermedades respiratorias provocadas por: *Salmonella choleraesuis*, *Actinobacillus spp*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolítica*, *Haemophilus somnus* y auxiliar en el tratamiento de pododermatitis causada por *Fusobacterium necrophorum*.

Recomendado para:

- Cerdos en crecimiento y desarrollo desde 11 a 18 semanas de edad, para el control de CRP. (*S. suis*, *A. pleuropneumoniae* y *P. multocida*).

- Cerdos de engorde y finalización, a la edad de 19 semanas a talla comercial, tratamiento selectivo en animales que persisten signos clínicos respiratorios (*Streptococcus spp*, *Pasteurella spp*, *Actinobacillus spp*, *Haemophilus spp*) y tratamiento de trastornos podales provocados por *F. necrophorum*.

- Madres y sementales, para control de enfermedades neumónicas, claudicación por trastornos podales y hembras en el tratamiento del puerperio MMA (mastitis, metritis y agalactia).

En Bovinos:

Para el tratamiento de infecciones respiratorias ocasionadas por: *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni*.

¿Por qué escoger el producto?

- Biodisponibilidad inmediata del ingrediente activo (Ceftiofur) micronizado que facilita la rápida difusión del antibiótico en el organismo antes de 15 minutos.

- Alta estabilidad; garantizada de 60 días una vez abierto el frasco.

- **Citius® 5%** es una suspensión de fácil homogeneidad lista para usarse. Días de retiro en carne 48 horas. Sin días de retiro en leche.

Dosis y administración:

Vía de Administración:

Bovinos: Intramuscular o subcutánea.

Porcinos: Intramuscular.

Bovinos:

Aplicar 1 a 3 ml por cada 50 Kg de peso durante 3 a 5 días (1 - 3 mg/Kg de peso).

Porcinos:

Aplicar 1 a 3 ml por cada 50 Kg de peso durante 3 días (1 - 3 mg/Kg de peso).

FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Ceftiofur	50 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml



Fosfosan®

Reconstituyente mineral en solución acuosa

Presentación: Frascos de 100 ml y 500 ml



Cerdos



Ganado de carne



Ganado de leche



Solución inyectable

Virbac

Fosfosan® está indicado en bovinos (doble propósito) y porcinos (carne y pie de cría) para la prevención y tratamiento de deficiencias de fósforo, selenio, magnesio, cobre, potasio y sus consecuencias tales como osteomalacia, raquitismo, síndrome de infertilidad carencial, distrofia muscular, retención placentaria, desórdenes nerviosos, tetania hipomagnésica.

Dosis y administración:

Especies: Bovinos (doble propósito) y porcinos (carne y pie de cría).

Vía de administración: Subcutánea o intramuscular.

Bovinos: Administrar 10 ml a los animales adultos y 5 ml a los terneros.

Porcinos: Administrar 5 ml a cada animal. Administrar como dosis única. Puede repetirse el tratamiento a los 15 días dependiendo del estado nutricional del animal. La duración del tratamiento será a recomendación del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Glicerofosfato de sodio 5.5 H ₂ O	14 g
Fosfato monosódico 2 H ₂ O	20.10 g
Cloruro de cobre 2 H ₂ O	0.40 g
Cloruro de potasio	0.60 g
Cloruro de magnesio 6 H ₂ O	2.50 g
Selenato de sodio	0.24 g
Vehículo c.b.p.	100 ml



Maxflor® L.A.

**Solución antibiótica inyectable
de larga duración**

Presentación: Frasco 100 ml

Virbac

Maxflor® L.A. es un antibiótico de amplio espectro para uso en rumiantes y porcinos. Para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por bacterias como: *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, síndrome diarreico causado por *Escherichia coli*, *Salmonella spp*, pododermatitis infecciosa bovina asociada a *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides melaninogenicus*, *Bacteroides nodosus*, así como en queratoconjuntivitis infecciosa bovina causada por *Moraxella bovis* y otras enfermedades causadas por bacterias susceptibles al efecto del Florfenicol.

Dosis y método de aplicación:

Bovinos intramuscular: Aplicar 1 ml por cada 20 Kg de peso.

Bovinos subcutánea: Aplicar 1 ml por cada 10 Kg de peso.

Se recomienda una segunda aplicación a las 48 horas.

Porcinos intramuscular: Aplicar 1 ml por cada 25 a 30 Kg de peso.

La duración del tratamiento será a juicio del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Florfenicol	400 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml



Megludyne®

Anti-inflamatorio no esterooidal
en solución acuosa inyectable.

Presentación: Frasco 100 ml

Virbac

Megludyne® está indicado en bovinos, caprinos, ovinos, cerdos y equinos, para el tratamiento de inflamaciones y dolores asociados con alteraciones músculo esqueléticas e inflamación aguda relacionada con enfermedades del tracto respiratorio y reproductivo.

En rumiantes y cerdos: Útil en el tratamiento de neumonías, septicemias, mastitis y diarrea.

En equinos: Dolores viscerales asociados a cólico e inflamación muscular.

Dosis y administración:

Bovino: Aplicación intravenosa o intramuscular, 2 ml por cada 45 Kg de peso (2.2 mg/Kg), cada 12 a 24 horas, por un período de hasta 5 días consecutivos.

Cerdos: Aplicación intramuscular profunda, 2 ml por cada 45 Kg de peso (2.2 mg/Kg), cada 24 horas.

Equinos: Aplicación intravenosa, 1 ml por cada 45 Kg de peso (1.1 mg/Kg), cada 12 a 24 horas de acuerdo a la severidad del caso. El tratamiento puede ser repetido por un período de hasta 4 días si reaparecen los síntomas.

FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Flunixin meglumina (equivalente a 50 mg de Flunixin base)	83 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml



Rilexine® 150

Rilexine® 150 antibiótico a base de Cefalexina

Virbac

Presentación: Frasco 100 ml

Rilexine® 150 es un antibiótico de amplio espectro para su uso en bovinos, porcinos, ovinos, y caprinos.

Para el tratamiento de infecciones respiratorias, urogenitales, gastrointestinales, de piel y tejidos blandos.

Rilexine® 150 es un antibiótico a base de Cefalexina, en suspensión oleosa, que actúa contra bacterias gram positivas y algunas gram negativas, tiene efecto bactericida y actúa por inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana. La cefalexina es resistente al efecto de la betalactamasa, enzima producida por algunas bacterias gram positivas, que inactivan a las Penicilinas.

Posee una excelente difusión en los tejidos, la concentración media tisular es muy superior a la concentración media plasmática. La eliminación de la Cefalexina, se efectúa en forma activa en un 85%, por vía urinaria. Su elevado índice terapéutico, hace de la Cefalexina, el antibiótico de elección, para los tratamientos de larga acción.

Rilexine® 150, es un antibiótico selectivo, dado que la Cefalexina tiene la cualidad de eliminarse por glándula mamaria, únicamente cuando está inflamada. Cuando la ubre está sana la Cefalexina no se elimina por la leche. Esto permite recomendarse como un producto con una restricción de cero días en leche, cuando se usa en problemas infecciosos que no involucren a la ubre.

Dosis y método de aplicación:

Vía de aplicación: Intramuscular.

Bovinos:

Aplicar 1 ml por cada 15 - 20 Kg de peso.

Porcinos, ovinos y caprinos:

Aplicar 1 ml por cada 15 Kg de peso.

Los tratamientos pueden repetirse cada 12 a 24 horas por 3 días consecutivos o a juicio del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Cefalexina (monohidrato)	150 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml



Rilexine® 200 NP

Antibiótico a base de Cefalexina,
Neomicina y Prednisolona

Presentación: Jeringas de 10 ml

Rilexine® 200 NP está indicado para el tratamiento de mastitis de vacas en producción láctea causadas por gérmenes sensibles a la fórmula (Neomicina + Cefalexina).

FÓRMULA

Cada jeringa contiene:

Cefalexina (monohidrato)	100 mg
Neomicina (sulfato)	100 mg
Prednisolona	10 mg
Excipiente c.b.p.	10 ml

Dosis y administración:

Vía de administración: Intramamaria.

- Administrar el contenido de una jeringa por cada cuarto afectado cada 12 horas durante 2 ó 3 días.

- Desinfectar la punta del pezón antes de la aplicación. Use la cánula corta exclusivamente en la punta del pezón.

- Aplique un ligero masaje sobre la ubre.



Rilexine® 500 N

Suspensión intramamaria
para vacas secas

Presentación: Jeringas de 10 ml

Rilexine® 500 N está indicado para el tratamiento de la mastitis durante el período seco en ganado lechero.

FÓRMULA

Cada jeringa de 10 ml contiene:

Cefalexina (benzatina)	250 mg
Neomicina (sulfato)	250 mg
Excipiente c.b.p.	10 ml

Dosis y administración:

Vía de administración: Intramamaria.

- Administrar el contenido de una jeringa por cada cuarto al final del último ordeño del período de lactación.

- Desinfectar la punta del pezón antes de la aplicación. Use la cánula corta exclusivamente en la punta del pezón.

- Aplique un ligero masaje sobre la ubre.



Shotapen® L.A.

Antibiótico en suspensión inyectable

Presentación: Frascos de 100 ml y 250 ml

Virbac

Shotapen® L.A. está indicado para el tratamiento de procesos infecciosos causados por neumonías bacterianas, síndrome MMA (mastitis, metritis, agalactia), infecciones puerperales, clostridiosis, erisipela, heridas infectadas, tratamiento postoperatorio y enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la penicilina y la estreptomycinina, en bovinos, porcinos, ovinos, equinos, caninos y felinos.

Dosis y administración:

Especies: Bovinos, porcinos, ovinos, equinos, caninos y felinos.

Vía de administración: Intramuscular.

FÓRMULA

Cada 1 ml contienen:

Penicilina G procaína	100.000 UI
Penicilina G benzatina	100.000 UI
Dihidroestreptomycinina (sulfato)	200 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml

Administrar 1 ml por cada 10-20 kg de peso (10,000 a 20,000 UI/kg) y repetir a las 72 hrs si es necesario, a recomendación del Médico Veterinario.



Virbamec® Platinum

Endectocida de larga acción para el tratamiento de parásitos internos y externos en el ganado bovino.

Presentación: Frasco 500 ml

Virbac

Dosis y administración:

Vía de administración: Subcutánea exclusivamente.

Bovinos: Administrar 1 ml por cada 50 Kg de peso a razón de 630 mcg de Ivermectina por Kg de peso, dosis única.

En garrapata común

Infestaciones hasta por
75 días

Contra Nuche

Infestaciones hasta por
140 días

Virbamec® Platinum está indicado para el tratamiento y control de infestaciones parasitarias causadas por:

Parásitos gastrointestinales: (formas adultas y cuarto estadio larvario) incluyendo *Ostertagia ostertagi* (incluso formas inhibidas), *O. lyrata*, *Haemonchus contortus*, *H. placei*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia pectinata*, *C. oncophora*, *Cooperia punctata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus* spp. (adultos), *Toxocara vitulorum* (adultos).

Parásitos pulmonares: *Diclyocaulus viviparus*.

Moscas: Estadio larvario de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*, *Cochliomyia hominivorax* y moscas chupadoras.

Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Damalinea bovis*.

Ácaros de la sarna: *Psoroptes communis* var. *bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Chorioptes bovis*.

Garrapatas: *Boophilus* spp.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Ivermectina	3.15 g
Vehículo c.b.p.	100 ml



Zeramec[®]

Anabólico no esterooidal y
desparasitante endectocida

Presentación: Frasco 250 ml

Virbac

Zeramec[®] está indicado como inductor del crecimiento por su efecto anabólico no esteroideo, además del tratamiento y control de nemátodos gastrointestinales y pulmonares, garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) spp.*, piojos y ácaros en bovinos (carne) y ovinos.

Dosis y administración:

Vía de administración: Subcutánea exclusivamente.

Bovinos (carne): Administrar 1 ml de **Zeramec[®]** por cada 50 kg de peso (200 mcg x kg de peso).

Ovinos: Administrar 1 ml de **Zeramec[®]** por cada 25 kg de peso (200 mcg x kg de peso).

Beneficios:

1. Crecimiento más rápido de los animales jóvenes.
2. Disminuye el estrés del animal y sus consecuencias.
3. Destete más rápido en machos.
4. Destete con mayor peso.
5. Mayor aprovechamiento de los potreros, acortando el ciclo de engorde.
6. Controla y trata animales con parasitismo medio.
7. Efecto embellecedor.
8. Liberación prolongada durante 90 días.
9. Dosis exacta para el peso del animal.

FÓRMULA

Cada 1 ml contienen:

Ivermectina	10 mg
Zeranol	10 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml

CARMEL®



Presentación: 12.7 cm



CRAYÓN DE PINTURA PARA GANADO JUMBO

Este crayón de pintura de marcado de ganado semisólido está envuelto en cartón fácil de agarrar. Viene en dos formulaciones para marcas audaces y duraderas a temperaturas cálidas. El crayón de la fórmula permanece firme en climas cálidos y se desliza suavemente en climas fríos.

TINTA PARA TATUAJE EN ROLL-ON

La tinta de tatuaje de ganado de **Carmel® Roll-on** está diseñada para que los ganaderos marquen el rebaño con fines de identificación. Está especialmente formulado con pigmentos de alta calidad sin plomo para proporcionar una máxima saturación, y el aplicador roll-on crea marcas audaces y altamente visibles.



Presentación: 59 ml



Presentación: 177 ml



TINTA PARA TATUAJE EN PASTA

La pasta de tinta de tatuaje de animal de **Carmel®** está diseñada para que los ganaderos marquen el rebaño con fines de identificación. Está especialmente formulado con pigmentos de alta calidad sin plomo para proporcionar una máxima saturación y crea marcas crujientes y altamente visibles.

Z

TAGSTM

DATAMARS

ARETES

Seguro y fácil de aplicar, su diseño de rotación libre promueve la rápida cicatrización de las heridas y permite que la etiqueta cuelgue correctamente para garantizar una mejor legibilidad tanto desde la parte delantera como trasera de la oreja del animal. El pasador metálico del botón macho facilita la inserción a través de orejas gruesas, diseñado para una retención superior con un material flexible que garantiza que la etiqueta no se enganche, ni se salga, ni se rompa.



Presentación: 62.3mm x 55.7mm



Presentación: 62.3mm x 55.7mm



Presentación: 29mm



ARETEADORAS



Mordaza de doble acción con retroceso y pasador abatible. Elimina orejas rasgadas y desgarradas, promueve la cicatrización y la retención de la etiqueta. Las asas ergonómicas permiten etiquetar la oreja del animal desde la parte frontal o posterior, resistente, duradera y confiable, muy recomendable para etiquetar ganado, ovejas, cerdos y animales mayores. No es necesario cambiar los pasadores del etiquetador ni agregar adaptadores entre las etiquetas VID y EID.

Este aplicador manual se utiliza para aplicar la gama **Z Tags** de crotales visuales y electrónicos de dos piezas. Su mango texturizado facilita su agarre y manejo durante el etiquetado, este aplicador de larga duración incluye un clip de seguridad y un compartimiento para guardar el pasador de repuesto.