


Catálogo MASCOTAS



MEDIVET

Medicinas Veterinarias



KUBUS



zoomevet





zoomvet



Arena para gatos



La arena para gatos **Cat Zoo** es un compuesto sanitario de absorción aglutinante de líquidos y olores para los desechos orgánicos de mascotas.

Está hecha con una mezcla de minerales y bentonita, que hace que la arena se aglutine cuando entra en contacto con los líquidos para que pueda sacar la orina del gato más fácilmente con la ayuda de la pala.

Su arenero tendrá un olor más suave porque los granos de arena aún limpios se separan de los sucios inmediatamente.

Uso y administración:

Ubique la caja de arena para gatos en un lugar tranquilo, privado y lejos del lugar donde come. Coloque suficiente **Cat Zoo** en el arenero para que el gato pueda enterrar sus necesidades cómodamente. Debe cambiar la arena del gato íntegramente con una frecuencia de entre dos y cuatro semanas.

Contraindicaciones y efectos secundarios:

No tiene contraindicaciones, incluso si hay ingestión accidental del producto.

No causa irritación en la piel de los animales ni en las personas.

Las partículas de **Cat Zoo** debido a su tamaño, no causan afecciones pulmonares en los animales ni en las personas que las manipulan.

No produce contaminación al medio ambiente.



Presentación: Bolsa de 6 kg

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g contienen:

Bentonita y otros aluminosilicatos.....	99 g
Material de relleno.....	1g

DERMIPEL ZOO

corrector dérmico



Presentación: 250 ml

Dosis y administración:

Vía oral directamente o mezclado con el alimento a juicio del médico veterinario.

Perros y gatos de 1 a 8 kg: 3 ml al día.

Perros 8 a 15 kg: 5 ml al día.

Perros 15 kg a 30 kg: 8 ml al día.

Perros 30 kg: 10 ml al día.



COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contienen:

Vitamina A	55000 UI
Vitamina D3	10000 UI
Vitamina E	120 UI
Vitamina B6	30 mg
Biotina	100 mcg
Cobre	8,34 mcg
Zinc	120 mg

Selenio	150 mcg
Colina	240 mg
Inositol	150 mg
Acido oleico (Omega 9)	1000 mg
Acido linoleico (Omega 6)	42000 mg
Acido linolénico (Omega 3)	4000 mg
Acido araquidónico (Omega 6)	120 mg
Otros ácidos grasos insaturados	46 mg

DERMIPEL ZOO CHAMPÚ



COSMÉTICO

Champú humectante, vitamínico y preventivo de la caída del pelo. Ayuda en la revitalización y regeneración del folículo piloso en perros, gatos y otros animales. El extracto natural de pantenol contiene en su composición sustancias similares a la queratina que es la proteína esencial del pelo, por lo que logra rejuvenecer las células, logrando un pelaje más elástico y flexible.

COMPOSICIÓN:

Pantenol.....1 g
Excipientes c.s.p.....100 ml

USO RECOMENDADO:

Vía tópica.

Moje el pelo totalmente. Aplique cantidad suficiente de champú al pelaje, masajee profundamente. Enjuague con abundante agua hasta eliminar residuos. Repita si es necesario.

AVENA

Champú con avena que limpia, acondiciona y da brillo al pelo de su mascota, dejándolo suave, sin nudos y con agradable aroma que perdura, la combinación de los activos logra revitalizar el pelo desde la raíz. El extracto natural de pantenol contiene en su composición sustancias similares a la queratina que es la proteína esencial del pelo, por lo que logra rejuvenecer las células, logrando un pelaje más elástico y flexible.

COMPOSICIÓN:

Pantenol.....1 g
Extracto de avena.....2 g
Excipientes c.s.p.....100 ml

CACHORROS

Champú con pantenol y extracto de manzanilla que protegen la piel y suavizan el pelo de su cachorro. El extracto natural de pantenol contiene en su composición sustancias similares a la queratina que es la proteína esencial del pelo, por lo que logra rejuvenecer las células, logrando un pelaje más elástico y flexible.

COMPOSICIÓN:

Pantenol.....1 g
Extracto de manzanilla.....2 g
Excipientes c.s.p.....100 ml



DOXI ZOO



Doxiciclina 100 mg/1ml en suspensión oral

Doxi Zoo está indicado para el tratamiento de ehrlichiosis canina, anaplasmosis, micoplasmosis en felinos, tratamiento de infecciones genitourinarias, respiratorias, amigdalitis, neumonía, dermatitis, abscesos, metritis entre otras.

Dosis y administración:

Administrar por **vía oral**.

Caninos y felinos: 1 ml/10 kg (10 mg de doxiciclina/kg), cada 24 horas, durante 14 a 21 días o según criterio del médico veterinario.



Composición:

Cada 1 ml contiene:

Doxiciclina (hiclato)..... 100 mg

Excipientes c.s.p..... 1 ml



Presentación: 30 ml

IVERMECZOO CREMA

Ivermectina al 4%

Crema sarnicida y acaricida de uso tópico

Ivermeczoo Crema es un compuesto a base de ivermectina para combatir la escabiosis, eliminar ácaros y parásitos externos. Su aplicación es tópica directamente sobre la piel, cicatriza y previene miasis o gusaneras en heridas.

Dosis y administración:

Perros: en caso de sarna aplicar una pequeña cantidad en la zona afectada separar perfectamente el pelo del animal y aplicar el producto sobre la piel, en animales de mucho pelo conviene rasurarle toda la zona para lograr una mejor absorción del producto. Se debe repetir la aplicación cada 7 días y continuar hasta ver la remisión de los síntomas. No aplicar en razas sensibles a la ivermectina como Pastores, Huskies, Collies y otros.

Gatos y conejos: en caso de *Otodectes cynotis*, aplicar una pequeña cantidad sobre la zona afectada.



Presentación: 100 g

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g contienen:

Ivermectina.....	4 mg
Excipientes c.s.p.....	1 g



MULTIVIT ZOO

multivitamínico inyectable

Multivit Zoo está recomendado como promotor de crecimiento, energizante, reconstituyente en animales de producción y con procesos carenciales (nutricionales, anemias y parasitosis).



Presentación: 250 ml



Dosis y administración:

Vía de administración recomendada:
Intramuscular o subcutánea.

Bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos:
1 ml por 50 k.p.v. cada 15 días durante 2 a 3 meses.
Caninos: 0,1 ml por 5 k.p.v.
Aves: 0,1 ml.

Composición:

Cada 100 ml contienen:

DL-Metionina.....	210 mg
L-Arginina.....	200 mg
L-Histidina.....	210 mg
L-Leucina.....	210 mg
L-Lisina.....	1000 mg
L-Treonina.....	100 mg
L-Triptófano.....	50 mg
L-Valina.....	200 mg
Glutamato de Sodio.....	420 mg
ATP.....	300 mg
Vitamina A Palmitato.....	3000000 UI
Cianocobalamina (Vit B12).....	5 mg
Colecalciferol (Vit D3).....	1000000 UI
Alfa-Tocoferol Acetato (Vit E).....	1000 mg
Citrato de Hierro Amoniacal.....	400 mg
Cloruro de Sodio.....	42 mg
Glicerofosfato de Sodio.....	1000 mg
Gluconato de Calcio.....	3.80 mg
Gluconato de Cobalto.....	20.10 mg
Gluconato de Magnesio.....	410 mg
Gluconato de Manganeso.....	318.70 mg
Gluconato de Zinc.....	167.20 mg
Selenito de Sodio.....	50 mg
Yoduro de Potasio.....	200 mg
Excipientes c.s.p.....	100 ml

Virbac



Alizin®

Antiprogestágeno para el control reproductivo de las perras.

Presentación: Frasco 10 ml

Virbac

Alizin® está indicado como tratamiento de las gestaciones no deseadas en perras entre los días 0 a 45 posterior a la monta.

Es un antagonista de la progesterona (anti-progestágeno) llamado Aglepristone, el cual compite por los receptores de la progesterona en el útero, impidiendo la capacidad de mantener la gestación.

Dosis y administración:

Vía de administración: Subcutánea estricta.

En perras, aplicar 2 inyecciones con intervalo de 24 horas entre una aplicación y otra, a la dosis de 0.34 ml por Kg de peso, es decir, 10 mg/Kg de peso.

Recomendaciones: Aplicar entre las escápulas o en la zona inguinal, después de la aplicación se sugiere dar un masaje ligero en la zona de aplicación. No administrar más de 5 ml en cada punto de inyección.

Advertencias: Puede presentarse dolor en el sitio de aplicación, por inflamación pasajera. En tratamientos tardíos los efectos terapéuticos se pueden acompañar con expulsión de productos orgánicos, ligera anorexia y congestión mamaria. Después del tratamiento el intervalo al próximo estro puede reducirse.

Este producto deberá manipularse con precaución por mujeres embarazadas o personas con susceptibilidad alérgica.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Aglepristone	30 mg
Vehículo c.b.p.	1.0 ml



Allermyl[®]

Shampoo dermatológico hidratante e hipoalergénico para perros

Presentación: Frasco de 250 ml

Virbac

Allermyl[®] es un shampoo terapéutico, hipoalergénico, cuya formulación favorece el restablecimiento y la hidratación del pelo, restauración de la integridad de la barrera cutánea y el mantenimiento del equilibrio natural de la piel. El ingrediente activo, piroctona olamina, actúa contra hongos y bacterias, controlando la proliferación y reduciendo la carga de alérgenos que representan factores que complican la dermatitis alérgica. Adicionalmente, la presencia de los monosacáridos D-galactosa, L-ramnosa y D-manosa y de los extractos vegetales de las especies *Filipendula ulmaria* (ulmaria) y *Peumus boldus* (boldo) actúan en las capas externas e internas de la piel, favoreciendo el equilibrio de sus defensas naturales.

Características y beneficios:

- La piroctona olamina controla la proliferación de hongos y bacterias, reduciendo la carga de alérgenos que complican la condición.
- Ayuda a restaurar la integridad de la barrera cutánea, lo cual es esencial para una piel sana.
- Favorece la hidratación y el buen estado del pelo.
- Los monosacáridos y extractos vegetales actúan en las capas de la piel para promover el equilibrio de sus defensas naturales.
- Formulación suave y especializada para pieles sensibles o con problemas.

Dosis y administración:

Después de mojar el pelo limpio del animal con agua tibia, aplicar el shampoo dermatológico **Allermyl[®]** esparciéndolo por todo el cuerpo en una cantidad suficiente para que se pueda enjabonar toda la superficie del animal. Masajear uniformemente el pelaje hasta formar espuma, dejando que el producto permanezca en el pelo durante 10 minutos. Enjuagar enseguida. Aplicar una o dos veces por semana, hasta la mejora del cuadro dermatológico, siguiendo siempre las recomendaciones del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Piroctona olamina	500 mg
Vehículo c.b.p.	100 ml

ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos



Aquadent®

Solución para la higiene oral de perros y gatos

Virbac

Presentación: Frasco de 250 ml

Aquadent® es una solución refrescante y palatable que debe ser adicionada al agua de bebida de los perros y gatos, para el control del mal aliento.

Dosis y administración:

- Agitar antes de usar.
- Diluya 5 ml de **Aquadent®** en 500 ml de agua utilizando el vaso dosificador del producto. Administrar la solución como agua de bebida al animal.
- Cambiar la solución cada 24 horas, aunque no haya sido totalmente consumida.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral. Diluido en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS

Consérvese en su envase original, perfectamente cerrado.

Consérvese en un lugar fresco y seco, entre 15°C y 30°C, protegido de la luz solar directa.

ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Xilitol	0.51 g
Vehículo c.b.p.	100 ml



Cortavance®

Alivio rápido de la inflamación y el prurito

Presentación: Frasco de 76 ml

Virbac

Cortavance® es un medicamento de uso veterinario, a base de aceponato de hidrocortisona como sustancia activa, que es un dermocorticoide que alivia rápidamente la inflamación y el prurito, en lesiones dérmicas que cursen con sintomatología compatible.

Características y beneficios:

- Recomendado y avalado por el Comité Internacional de Enfermedades Alérgicas de los Animales.
- Tratamiento en spray para uso tópico exclusivo. No invasivo.
- Se puede aplicar inclusive hasta en un tercio del cuerpo a la vez, diariamente según dosis recomendada.
- **Cortavance®** puede usarse a largo plazo en el tratamiento para la dermatitis atópica.
- **Cortavance®** actúa sólo a nivel de piel. No hay absorción transdérmica a nivel de dosis y efectos secundarios nulos a insignificantes.
- Contiene HCA (acepomato de hidrocortisona) que es 30 veces más potente que la hidrocortisona, es altamente lipofílico, se absorbe rápidamente en la capa dérmica, creado un efecto de depósito concentrado de ingredientes activos.
- No produce efectos secundarios asociados a la terapia sistémica.

Dosis y administración:

- Accionar 2 veces el atomizador.
- Dosis recomendada 1.52 ug de HCA/cm² de piel afectada al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Pulsar el atomizador del spray, a una distancia aproximada de 10 cm de la zona a tratar. La dosis a aplicar será bajo indicación exclusiva del Médico Veterinario tratante, según el caso durante 7 días consecutivos.


FÓRMULA

Cada 1ml contienen:

Hidrocortisona aceponato (HCA)	0,584 mg/ml
Vehiculo c.b.p	1 ml

Endogard®

Endogard® con su exclusiva combinación de cuatro principios activos lo hace único como tratamiento antiparasitario interno para perros



El hueso desparasitante más completo y palatable contra:



- Gusano del corazón
- Gusanos redondos
- Gusanos planos
- Giardia



Para dirofilariosis se recomienda administrar en forma mensual. Para giardiosis se recomienda administrar cada 24 horas durante 2 o 3 días consecutivos y dependiendo de la reinfestación repetir a las 2 o 3 semanas. El Médico Veterinario decidirá la frecuencia más adecuada para cada caso.

Cada tableta de **Endogard®** está diseñada con el sistema CPR, el cual facilita dividir la tableta. Coloque la tableta en una superficie plana con la cara Virbac hacia arriba, presione con el dedo y la tableta se fraccionará en dos partes iguales.

Endogard® es un tratamiento antiparasitario interno de amplio espectro y es palatable, lo que facilita la administración al poder manejarse como un premio.

Actúa contra los siguientes parásitos:

Nematodos: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *A. braziliense*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Strongyloides stercoralis*, *Pneumonyssus caninum*, *Capillaria spp*, *Spirocerca lupi*, *Dipetalonema reconditum*, *Dirofilaria immitis* (microfilarias), *Dirofilaria repens*, (microfilarias), *Oncicola canis*, *Physaloptera canis*.

Cestodos: *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *E. Vogeli*, *Spirometra spp*, *Taenia pisiformis*, *T. hydatigena*, *T. serialis*, *T. multiceps*, *Diphyllobothrium spp*, *Mesocestoides spp*.

Trematodos: *Scistosoma spp*.

Protozoarios: *Giardia canis*.

Fórmula:

Cada tableta contiene	Endogard® 2.5	Endogard® 10	Endogard® 30
Febantel	37.5 mg	150 mg	450 mg
Pamoato de pirantel	36 mg	144 mg	432 mg
Praziquantel	12.5 mg	50 mg	150 mg
Ivermectina	0.015 mg	0.06 mg	0.18 mg
Excipiente c.b.p.	225 mg	900 mg	2700 mg

Dosis y administración:

Administrar 1 tableta según el peso de animal como dosis única. Presentaciones para **2.5, 10 y 30 kg** de peso.

Cada kg de peso tratado con **Endogard®** equivale a:

- 15 mg de febantel.
- 14.4 mg de pamoato de pirantel.
- 5 mg de praziquantel.
- 0.006 mg de ivermectina.



Epiotic®

Solución ótica para la higiene del conducto auditivo
y pre-tratamiento de la otitis externa de perros y gatos

Presentación: Frasco de 100 ml

Virbac

Epiotic® es una solución ótica (para los oídos) con un pH neutro que actúa como un antiséptico. Su formulación única incluye Dioctil Sulfosuccinato de Sodio (DSS), EDTA disódico, cloroxilenol y ácido salicílico, así como una combinación de monosacáridos y extractos de plantas.

Características y beneficios:

- Ayuda a eliminar el exceso de secreción serosa y purulenta. Esto prepara el oído para recibir otros medicamentos de manera más efectiva.
- El ácido salicílico y el cloroxilenol actúan como antisépticos, lo que ayuda a reducir la proliferación de levaduras y bacterias que comúnmente causan la otitis externa.
- Facilita la regeneración del tejido del conducto auditivo, propiciando un ambiente favorable para su recuperación.
- **Epiotic®** contiene monosacáridos (D-galactosa, L-ramnosa y D-manosa) y extractos vegetales (ulmaria y boldo) que actúan en las capas de la piel para favorecer el equilibrio de sus defensas naturales.

Dosis y administración:

DOSIS:

- Para limpieza de rutina, aplicar cantidad suficiente de producto en un algodón seco.
- Para pre-tratamiento aplicar en cantidad suficiente para llenar por completo el canal auditivo.

MODO DE USO:

Limpiar las áreas externas de la oreja una o dos veces por semana. Pre-tratamiento: Masajear desde la base de la oreja y limpiar la suciedad con un algodón seco. Se puede usar cada 12 horas, de 3 a 5 días antes de aplicar el agente terapéutico, o según lo indique el veterinario.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Ácido salicílico	200 mg
Vehículo c.b.p	100 ml



Hexadene® Spherulites

Champú antiséptico y contra levaduras de la piel en perros y gatos

Presentación: Frasco de 250 ml

Virbac

Para su uso en perros y gatos. El amplio espectro de la clorhexidina y su baja toxicidad hacen de **Hexadene® Spherulites** un antiséptico de elección para la curación de heridas en la piel, lavado pre-quirúrgico, piodermias, como adyuvante en infecciones por *Malassezia pachydermatis* y hongos.

Dosis y modo de uso:

Se recomienda aplicar de 2 o 3 veces por semana, dependiendo de la condición clínica del paciente, hasta la mejora de los signos (2-4 semanas). Posteriormente úselo una vez por semana. A recomendación del Médico Veterinario.

Para lavado de heridas o lavado pre-quirúrgico, úselo en una dilución con una parte de **Hexadene® Spherulites** por 16 partes de agua.

MODO DE USO

Agite el producto antes de usar. Aplique **Hexadene® Spherulites** sobre el pelaje previamente mojado, dando masaje vigoroso en todo el cuerpo del animal hasta formar abundante espuma. Espere de 10 a 15 minutos antes de enjuagar perfectamente. Repita todo el procedimiento.

ADVERTENCIAS

Consulte a su médico veterinario.
Su venta requiere receta médica.

ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Clorhexidina (gluconato) 20%	3.0 g
Microcápsulas	2.7 g
Vehículo c.b.p.	100 ml



Nutri-plus gel®

Suplemento energético para perros y gatos

Presentación: Tubo con 120.5 g

Virbac

Nutri-plus gel® es un suplemento energético nutricional para perros y gatos que aporta vitaminas, minerales y oligoelementos a la dieta del animal.

Es un complemento nutricional de alta energía que puede ser administrado a animales en convalecencia postoperatoria o durante alguna enfermedad, para contrarrestar la pérdida de apetito, estados carenciales, desarrollo de animales jóvenes y en períodos de esfuerzos prolongados, de estrés y entrenamiento, así como para hembras gestantes o en lactación.

Recomendado para:

Perros y gatos.

Dosis y administración:

Perros y gatos:

Si **Nutri-plus gel®** es la principal fuente de alimento, administre de 2 a 4 cucharadas por 5 kg de peso al día.

Al ser usado como complemento nutricional, administre de 1 a 2 cucharadas por cada 5 kg de peso al día.

Una cucharada equivale a 5 ml.

Vía de administración:

Oral o mezclado con el alimento.

FÓRMULA

Cada 100 g contienen:

Vitamina A	17635 UI
Vitamina D3	882 UI
Vitamina E	106 UI
Tiamina (B1)	35.25 mg
Riboflavina (B2)	3.5 mg
Piridoxina HCl (B6)	17.6 mg
Cianocobalamina (B12)	35.25 mcg
Nicotinamida	35.25 mg
Pantotenato Calcio	35.25 mg
Ácido Fólico	3.5 mg
Sulfato de magnesio	70.5 mg
Sulfato de manganeso	72.0 mg
Yoduro de Potasio	50 mg
Hierro	50 mg
Excipientes c.b.p.	100 g



Sebolytic®

Champú dermatológico con acción antiseborreica para perros

Presentación: Frasco de 250 ml

Virbac

SEBOLYTIC® es un shampoo terapéutico diseñado para el tratamiento y control de las dermatitis seborreicas en perros. Su fórmula avanzada ayuda a restaurar la integridad del pelaje y a mantener el equilibrio natural de la piel. Contiene ingredientes como gluconato de zinc, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) y aceite de melaleuca para una mejor exfoliación y reducción de grasa, además de piroctona olamina para controlar hongos y bacterias que complican estas afecciones. Adicionalmente, incluye monosacáridos y extractos vegetales de ulmaria y boldo que favorecen el equilibrio de las defensas naturales de la piel.

Características y beneficios:

- Específicamente formulado para el control de desquematizaciones y trastornos queratoseborreicos mixtos.
- Sus propiedades antiseborreicas contribuyen a disminuir el exceso de sebo en la piel.
- Ayuda a que el pelaje recupere su integridad.
- Promueve el mantenimiento del equilibrio natural de la piel.
- Los componentes complementarios actúan en las capas de la piel para favorecer el equilibrio de sus defensas naturales.

Dosis y administración:

Después de mojar el pelo limpio del animal con agua, aplicar el shampoo dermatológico **SEBOLYTIC®** esparciéndolo por todo el cuerpo en una cantidad suficiente para que se pueda enjabonar toda la superficie del animal. Masajear uniformemente hasta formar espuma, dejando que el producto permanezca en el pelo durante 10 minutos. Enjuagar enseguida. Repetir el procedimiento. Aplicar una o dos veces por semana, hasta la mejora del cuadro dermatológico, siguiendo siempre las recomendaciones del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Piroctona olamina	500 mg
Vehículo c.b.p.	100 ml

ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos



Shotapen® L.A.

Antibiótico en suspensión inyectable

Presentación: Frascos de 100 ml y 250 ml

Virbac

Shotapen® L.A. está indicado para el tratamiento de procesos infecciosos causados por neumonías bacterianas, síndrome MMA (mastitis, metritis, agalactia), infecciones puerperales, clostridiosis, erisipela, heridas infectadas, tratamiento postoperatorio y enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la penicilina y la estreptomicina, en bovinos, porcinos, ovinos, equinos, caninos y felinos.

Dosis y administración:

Especies: Bovinos, porcinos, ovinos, equinos, caninos y felinos.

Vía de administración: Intramuscular.

FÓRMULA

Cada 1 ml contienen:

Penicilina G procaína	100.000 UI
Penicilina G benzatina	100.000 UI
Dihidroestreptomicina (sulfato)	200 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml

Administrar 1 ml por cada 10-20 kg de peso (10,000 a 20,000 UI/kg) y repetir a las 72 hrs si es necesario, a recomendación del Médico Veterinario.



Zoletil® 50

Anestésico para perros y gatos

Presentación: Frasco con 675 mg de liofilizado y diluyente estéril de 5 ml

Virbac

Zoletil® es una solución anestésica, compuesta por Tiletamina, que le confiere una anestesia disociativa óptima, además de una eficiente analgesia; y Zolazepam que es una benzodiazepina cuyo mecanismo de acción produce una inmejorable relajación muscular y un potente efecto anticonvulsivo. Indicado para todo tipo de cirugías mayores y menores, así como para sedación, tranquilización, toma de muestras, restricción, profilaxis, suturas, limpieza de oídos y otros procedimientos que ameriten la sedación del animal.

Dosis y administración:

Vía intramuscular

Perros	0.15 - 0.5 ml/Kg	7.5 a 25 mg/Kg
Gatos	0.2 - 0.3 ml/Kg	10 a 15 mg/Kg

Vía endovenosa

Perros	0.1 - 0.2 ml/Kg	5 a 10 mg/Kg
Gatos	0.1 - 0.15 ml/Kg	5 a 7.5 mg/Kg

FÓRMULA

Cada frasco de liofilizado contiene:

Tiletamina (como clorhidrato)	125 mg
Zolazepam (como clorhidrato)	125 mg
Excipientes c.b.p.	675 mg
Frasco de solvente contiene: Diluyente estéril c.b.p.	5 ml

Recomendaciones:

En caso de presentar salivación, puede ser controlada con la administración de **Atropina**:

Perros: 0.044 mg/Kg.

Gatos: 0.05 mg/Kg.


Usar como pre-anestésico por vía subcutánea, minutos antes de la administración de **Zoletil**.

No existe un antídoto específico. Para estimular el post-operatorio de un animal anestesiado con **Zoletil**, se recurre a los métodos clásicos:

- Lucha contra la hipotermia (manta caliente, bolsa de agua caliente, lámpara infrarroja)
- Tratamiento eliminatorio: perfusión más protección de las funciones hepáticas y renales.
- Estimulantes respiratorios para rápida recuperación: Una dosis de 5.5 mg/Kg de Doxapram (0.55 ml/Kg) que permite contrarrestar el efecto de 30 mg/Kg de **Zoletil**.
- Se recomienda no administrar alimentos como mínimo 12 horas antes de la aplicación.
- Se deben retirar los collares antiparasitarios 24 horas antes de la administración.

Conservación después de la reconstitución del **Zoletil**:

- 24 horas a temperatura ambiente.
- 8 días si es refrigerado a 4°C.



CHINFIELD

AMINOÁCIDOS VIT

BENEFICIOS:

Aminoácidos Vit aporta los aminoácidos esenciales para mantener o restaurar el nivel proteico adecuado, las vitaminas indispensables para el aprovechamiento de los mismos y los electrolitos necesarios para asegurar la isotonía.

INDICACIONES:

Deshidratación de cualquier origen (diarreas, poliuria, hepatopatías, sudoración intensa), intoxicaciones, estados de agotamiento físico, estado de estrés, hemorragias, pérdida de electrolitos, hipoproteinemias, convalecencias, inapetencia y sobreentrenamiento.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Equinos:

Inyección endovenosa LENTA: 0,1 a 0,5 ml por cada kg P.V.

Oral: 0,15 a 0,7 ml por cada kg P.V.

Bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos y porcinos:

Inyección endovenosa lenta, intramuscular o subcutánea:

0,1 a 0,5 ml por cada kg P.V.

Oral: Hasta 2 meses de edad.

0,15 a 0,7 ml por cada kg P.V.

Caninos y felinos:

Inyección endovenosa lenta, intramuscular o subcutánea:

0,1 a 0,3 ml por cada kg P.V.

Oral: 0,15 a 0,4 ml por cada kg P.V.

Intervalo entre dosis para todas las especies:

Según criterio del Médico Veterinario.

FÓRMULA:

Arginina.....	300 mg	Pantotenato de Calcio.....	1000 mg
Fenilalanina.....	100 mg	Vitamina B1 (clorhidrato).....	50 mg
Histidina clorhidrato.....	50 mg	Vitamina B2 (fosfato).....	10 mg
Leucina.....	75 mg	Vitamina B6 (clorhidrato).....	25 mg
Triptófano.....	50 mg	Vitamina B12.....	1.000 ug
Treonina.....	50 mg	Vitamina C.....	300 mg
Valina.....	100 mg	Cloruro Sodio.....	900 mg
Cisteína (clorhidrato).....	100 mg	Cloruro potasio.....	100 mg
Lisina (clorhidrato).....	500 mg	Cloruro de magnesio.....	50 mg
Glicocola.....	1000 mg	Cloruro de cobalto.....	10 mg
Metionina.....	400 mg	Citrato de sodio.....	100 mg
Nicotinamida.....	200 mg	Sorbitol.....	5000 mg
		Agentes de formulación c.s.p.....	100 ml



Presentación: 250 ml

AMINOSUC

BENEFICIOS:

Aminosuc es una asociación de vitaminas y minerales esenciales integrados con aminoácidos, que constituyen un suplemento alimenticio, especialmente adaptado para complementar la ración del animal. Su administración durante 10 días consecutivos, garantiza un perfecto equilibrio alimenticio, que suple todas las exigencias dietéticas del animal y le permite aprovechar al máximo el valor calórico y de reposición de la ración.

INDICACIONES:

Hipovitaminosis, pérdida de peso, animales en crecimiento, raquitismo, convalecencia, entrenamiento, animales físicamente disminuidos por edad, enfermedad, preñez y lactancia. Para llevar al animal a óptimas condiciones de rendimiento y salud.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Equinos y bovinos: Suministrar 10 ml por cada 100 kg P.V. o 1 ml por cada 10 kg P.V. una o dos veces por día directamente en la boca, durante 10 días seguidos y 20 días de descanso según el requerimiento del animal o indicación del Médico Veterinario. En animales muy disminuidos, administrar durante 20 a 30 días seguidos.

Porcinos, caprinos, ovinos, aves, caninos y felinos: 1 ml por cada 10 kg P.V. 1 o 2 veces por día directamente en la boca, durante 10 días seguidos y 20 días de descanso según el requerimiento del animal o indicación del Médico Veterinario. En animales muy disminuidos, administrar durante 20 a 30 días seguidos.

FÓRMULA:

Vitamina A.....	150000 UI
Vitamina B1 clorhidrato.....	750 mg
Vitamina B2 fosfato.....	150 mg
Vitamina B6 clorhidrato.....	120 mg
Vitamina B12.....	5000 ug
Vitamina B13.....	75 mg
Vitamina B15.....	10 mg
Vitamina C.....	5000 mg
Vitamina D2.....	200000 UI
Vitamina E.....	150 mg
Vitamina H.....	1 mg
Nicotinamida.....	500 mg
Pantotenato de Calcio.....	150 mg
Acido Fólico.....	5 mg

Aminoácidos (caseína).....	20.000 mg
Metionina.....	500 mg
Lisina.....	500 mg
Fosfato Tricálcico.....	20.000 mg
Hidróxido de Magnesio.....	10.000 mg
Sulfato Ferroso.....	2.000 mg
Cloruro de Cobalto.....	150 mg
Sulfato de Cobre .5H2O.....	75 mg
Sulfato de Manganeso.....	100 mg
Sulfato de Zinc.....	50 mg
Ioduro de Potasio.....	750 mg
Cloruro de Sodio.....	5.000 mg
Lecitina.....	5.000 mg
Agentes de formulación c.s.p.....	1.000 ml



AGITAR ANTES DE USAR

Presentación: 1000 ml y 120 ml

ANTILIS

BENEFICIOS:

Antilis es una medicación de potente y efectiva acción espasmolítica, miorrelajante y analgésica, especialmente adaptada para el equino deportivo, cuya acción se centra en las estructuras anatómicas de fibra lisa, innervadas por el sistema neurovegetativo, tracto gastroentérico, colédoco, vías urinarias y útero.

Con su administración, los cólicos espasmódicos ceden rápidamente y por lo general en forma total y definitiva, con la pronta recuperación del animal. Comúnmente, este resultado se logra con la primera dosis, aunque si es necesario, puede repetirse el tratamiento 1 o 2 horas después de la primera administración.

INDICACIONES:

Cólicos espasmódicos gastrointestinales y post-quirúrgicos, espasmos cervicales, uterinos y de las vías urinarias (litiasis renal), partos distócicos y algias de los órganos de fibra lisa.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos y caninos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración:

Equinos:

Intramuscular

Inyección endovenosa **LENTA**.

Equinos adultos: Aplicar 10 ml

Potros: Aplicar 2 ml por cada 100 kg P.V.

Repetir a las 4 o 6 hrs, según recomendación del Médico Veterinario.

Vía de administración:

Caninos:

Subcutánea

Intramuscular

Inyección endovenosa **LENTA**.

Aplicar 0.5 ml por cada 10 kg P.V.

Repetir cada 24 hrs según recomendación del Médico Veterinario.



Presentación: 10 ml

FÓRMULA:

N-Butilbromuro Hioscina.....	1 g
Papaverina (clorhidrato).....	1 g
Dipirona sódica (monohidrato).....	25 g
Agentes de formulación c.s.p.....	100 ml

ANTIISTAMÍNICO

BENEFICIOS:

Los procesos alérgicos afectan a los diferentes órganos y tejidos y se manifiestan con la sintomatología más variada, que puede ir desde una simple dermatopatía hasta el shock mortal.

Antihistamínico Chinfield tiene como principio activo un antihistamínico potente y de amplio espectro, efectivo para reducir y eliminar cualquier reacción alérgica. También tiene acción preventiva, por lo cual es aconsejable su uso cuando se prevé una reacción de este tipo. Administrado en las dosis que se indica, **Antihistamínico Chinfield** es inocuo y casi por completo carente de reacciones secundarias, lo que permite su uso cada vez que sea necesario.

INDICACIONES:

Procesos alérgicos de cualquier etiología y localización y en todos los casos en que está indicada una medicación antihistamínica.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Equinos, bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos y porcinos: 1 a 2 ml por cada 100 kg P.V., cada 6, 8, 12 o 24 hrs según recomendación del Médico Veterinario.

Caninos y felinos:

0.2 a 0.4 ml por cada kg P.V.

Caninos: cada 8, 12 o 24 hrs según la recomendación del Médico Veterinario.

Felinos: cada 12 o 24 hrs según la recomendación del Médico Veterinario.

Vía endovenosa o intramuscular según la urgencia y recomendación del Médico Veterinario.

FÓRMULA:

Clorhidrato de Difenhidramina1000 mg
Agentes de formulación c.s.p.100 ml



Presentación: 50 ml

B-12 50.000 mcg

BENEFICIOS

La vitamina B12 es un potente antianémico que actúa aumentando el número de glóbulos rojos hasta el valor normal. Es un neurotónico muy efectivo que contribuye a la solución de problemas de neuritis, neuralgias, mialgias y otros trastornos neurológicos. Estas cualidades lo hacen muy eficiente en la recuperación de animales sometidos a sobreentrenamiento, convalecientes de enfermedades orgánicas, infecciosas o parasitarias.

INDICACIONES:

Anemias de cualquier tipo (disminución del número de glóbulos rojos), procesos neurológicos (neuralgias y neuritis), convalecencias, debilidad, tónico inespecífico para ayudar a la recuperación de animales decaídos.

ESPECIES:

Equinos, bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar 0,5 ml a 1 ml por cada 50 k.p.v. cada 48 hrs o según indicación del Médico Veterinario.
Inyección intramuscular o endovenosa LENTA.

Efectos adversos y contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto.

No presenta efectos adversos usando la dosis recomendada.

FÓRMULA

Vitamina B12 (cianocobalamina).....50000 mcg
Agentes de formulación c.s.p.....50 ml



Presentación: 50 ml

CIPROHEPTADINA

BENEFICIOS

Ciproheptadina Chinfield es un jarabe que aumenta el apetito, favorece el desarrollo muscular, estimula la función hepática y la secreción de los jugos digestivos actuando como tónico general. Levanta en breve tiempo animales caídos, debilitados o convalecientes. No interfiere con otros tratamientos y está indicado cuando se administran vitaminas, hepatoprotectores y antianémicos.

INDICACIONES:

Estimulante del apetito, indicado en anorexia, avitaminosis, pérdida de peso, falta de desarrollo, inapetencias, convalecencias y debilidad muscular.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equinos, bovinos: Vía oral, 10 ml por cada 100 kg P.V.

Caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos, aves y conejos: Vía oral, 1 ml por cada 10 kg P.V.

Se recomienda administrar 2 horas antes de la ración, puro, directamente en la boca, durante 20 días consecutivos o según indicación del Médico Veterinario.

Refrigerar después de abierto.

FÓRMULA

Cada 1000 ml contiene:

Ciproheptadina (clorhidrato).....	1g
Lisina (clorhidrato).....	100 g
Betaína (clorhidrato).....	30 g
Vitamina B12.....	20 mg
Agentes de formulación c.s.p.....	1000 ml



Presentación: 1000 ml y 100 ml

COAGULANTE

BENEFICIOS

Coagulante Chinfield cubre todo el cuadro de hemorragias de cualquier etiología y localización, gracias a los dos componentes activos de su formulación. Se administra cuando se produce un derrame sanguíneo, se obtiene rápidamente la detención completa de la efusión hemática y si se administra preventivamente, se consigue evitar la pérdida de sangre.

Al inyectarlo una hora antes de cualquier intervención quirúrgica, se tendrá un campo operatorio más claro y se facilita de esta manera la maniobra operatoria. La vitamina K por su inherencia en la formación de protrombina, y la ciclonamina acelerando la transformación de protrombina en trombina, prolonga significativamente el tiempo de actividad del producto.

INDICACIONES:

Prevención y tratamiento de hemorragias de cualquier etiología y localización.



Presentación: 10 ml

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equino – Bovinos: 2 a 4 ml por cada 100 k.p.v. o según criterio del Médico Veterinario.

Caninos – Felinos: 0,25 a 1,5 ml por cada 100 k.p.v. según el tamaño del animal o según criterio del Médico Veterinario.

Repetir 1 o 2 veces por día hasta que cese la hemorragia.

Inyección Endovenosa LENTA o Intramuscular LENTA.

Intervalo entre dosis: Mínimo 12 horas o según criterio del Médico Veterinario.

Efectos adversos y contraindicaciones:

En caso de inyección endovenosa rápida puede producir leve hipotensión transitoria. Si se produjeran coágulos intravasculares, utilizar drogas como sulfonilureas (tolbutamida, clorpropamida), a efectos de mejorar la actividad fibrinolítica.

ANTAGONISTAS FARMACOLÓGICOS:

Cumarina y warfarina.

Precauciones:

Condiciones de asepsia y antisepsia para inyección parenteral.

No mezclar con otros productos en la misma jeringa.

No exceder los 10 ml por punto de aplicación intramuscular, en estos casos, repartir en dos lugares.

FÓRMULA

Ciclonamina.....	15 g
Vitamina K1.....	50 mg
Agentes de formulación c.s.p.....	100 ml

DIURETIC

BENEFICIOS

Existe una entidad fisiopatológica caracterizada por la retención de agua en distintos tejidos, el edema, cuya medicación de fondo se basa fundamentalmente en la eliminación de ese exceso de agua, por vía renal mediante fármacos que aumenten la diuresis, los denominados diuréticos. **Diuretic** aumenta significativamente la eliminación de agua por vía renal (acción renotrópica) y lo que es más importante para el tratamiento del edema, la eliminación de sodio por la misma vía, ya que el agua le sigue pasivamente por acción osmótica. **Diuretic** es uno de los diuréticos-saluréticos más potentes. Con su administración se logra eliminar en breve tiempo el edema y sus efectos concomitantes, manteniendo en un nivel bajo la eliminación de potasio. La potente actividad de este fármaco permite manejar la diuresis en la forma necesaria, adecuando la dosis a administrar según lo aconseje la gravedad y evolución de la enfermedad.



Presentación: 10 ml

INDICACIONES:

Edemas de cualquier etiología y localización: de ubre pre y postparto, renal, cerebral, cardíaco, pulmonar, por obstrucción vascular, hipertensión arterial, hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio (HPIE).

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos, felinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Administrar por inyección endovenosa o intramuscular según necesidad o urgencia.

Equinos y Bovinos:

0,4 a 1,2 ml por cada 100 k.p.v. (20 a 60 mg de furosemida).

Caninos y Felinos: 0,04 a 0,1 ml por cada k.p.v. (2 a 5 mg de furosemida).

1 a 3 veces por día, según criterio del Médico Veterinario.

Incompatibilidades:

Anfotericina B: Su uso conjunto puede producir hipopotasemia.

Glucósidos Digitálicos: Puede aumentar la posibilidad de intoxicación digitálica asociada a hipopotasemia.

Acido Acetilsalicílico: En casos de hipoprotombinemia.

Teofilina: Por potenciación de su efecto.

Fenilbutazona: Disminución del efecto diurético por inhibición de prostaglandina de origen renal.

SOBREDOSIFICACION:

En caso de una sobredosificación accidental, suspender la administración del fármaco y reestablecer el equilibrio hidroelectrolítico inmediatamente.

DL 50 en perros 400 mg por cada k.p.v. por vía endovenosa.

FÓRMULA

Furosemida.....5000 mg
Excipientes c.s.p.....100 ml

FUROFIELD

BENEFICIOS

La furosemida aumenta significativamente la eliminación de agua por vía renal (acción renotrópica) y lo que es más importante para el tratamiento del edema, la eliminación de sodio por la misma vía, ya que el agua le sigue pasivamente por acción osmótica. Con su administración se logra eliminar en breve tiempo el edema y sus efectos concomitantes, manteniendo en un nivel bajo la eliminación de potasio. La potente actividad de este fármaco permite manejar la diuresis en la forma necesaria, adecuando la dosis a administrar según lo aconseje la gravedad y evolución de la enfermedad.

Diurético y anti-inflamatorio que promueve la excreción del cloro y potasio. Su efecto diurético es independiente del estado de equilibrio ácido básico del paciente. La dexametasona posee una actividad antiinflamatoria y antiestrés. La experiencia clínica demuestra que los edemas se ven notablemente disminuidos por este fármaco.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equinos, Bovinos, Ovinos y Caprinos: 2 a 5 ml por cada 100 k.p.v. cada 24 horas o a criterio del Médico Veterinario.
Caninos y Felinos: 0,25 a 0,5 ml por cada 5 k.p.v. con intervalo entre dosis de 12 o 24 horas o según criterio del Médico Veterinario.

El producto se aplicará en las dosis indicadas, por vía endovenosa LENTA o intramuscular.

Efectos adversos y contraindicaciones:

No aplicar en caso de infecciones sistémicas agudas (a menos que esté instaurada terapia antimicrobiana específica). Evitar vacunas de organismos atenuados. Tampoco debe utilizarse en pacientes con tuberculosis activa o dudosamente inactiva exceptuando cuando se utiliza en conjunción con drogas tuberculostáticas. No sobredosificar para evitar desequilibrios electrolíticos producidos por furosemida. No administrar a animales con trastornos renales agudos. No administrar a hembras en su tercer trimestre de gestación por la presencia de dexametasona que podría provocar inducción al parto prematuro no deseado. Un tratamiento prolongado puede provocar hipercorticismismo, así como la suspensión brusca del fármaco podría provocar hipocorticismismo.

INTERACCIONES:

Anfotericina B diuréticos depletors de Potasio: Su uso conjunto puede producir hipopotasemia.

Glucósidos Digitálicos: Puede aumentar la posibilidad de intoxicación digitálica asociada a hipopotasemia.

Acido Acetilsalicílico: En casos de hipoprotinemia.

Teofilina: Por potenciación de su efecto.

Fenilbutazona: Disminución del efecto diurético por inhibición de prostaglandina de origen renal.

Isoniazida: Su efectividad antituberculosa puede disminuir por aumento del metabolismo hepático.

FÓRMULA

Furosemida.....5 g
 Dexametasona 21 fosfato.....0,2 g
 Agentes de formulación c.s.p.....100 ml



Presentación: 25 ml

HEMOFIELD

BENEFICIOS

Hemofield es un antianémico y antineurítico eficaz para lograr rápida recuperación en anemias no ferropénicas. La eficiente combinación en su fórmula del ácido fólico, fundamental en la síntesis del ácido desoxirribonucleico y por lo tanto de la eritropoyesis lo que lo convierte en un factor esencial de crecimiento y maduración eritrocítica, junto a vitamina B12, la vitamina "antianémica" y vitamina B1, la vitamina antineurítica por excelencia, hacen de **Hemofield** la elección cuando baja el rendimiento del animal sin causas aparentes que lo justifiquen, cuando se sospecha sobreentrenamiento o cuando el hemograma arroja valores subnormales en el recuento de glóbulos rojos.

INDICACIONES:

Animales expuestos a enfermedades infecciosas o parasitarias anemizantes.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, caprinos, ovinos y caninos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equinos y bovinos en crecimiento:

2,5 ml por cada 100 k.p.v. diarios.

Equinos y bovinos adultos: 10 ml diarios.

Caninos, caprinos y ovinos:

1 ml por cada 25 k.p.v. diarios.

Aplicar por vía endovenosa LENTA (de elección). También se puede aplicar por vía intramuscular.

FÓRMULA

Ácido Fólico.....	0,1 g
Vitamina B1.....	10 g
Vitamina B12.....	0,2 g
Agentes de formulación c.s.p.....	100 ml



Presentación: 50 ml

HEPATOFIELD

BENEFICIOS

Los equinos, son animales expuestos a alto nivel de estrés por el exigente entrenamiento al que son sometidos. Por su casi permanente encierro y por los diferentes tratamientos que reciben, frecuentemente dan como resultado problemas hepáticos de tipo colestático debido a obstrucciones del drenaje biliar, congestiones e inflamaciones intestinales, cólicos e intoxicaciones de origen exógeno o endógeno.

El síndrome de colestasis se manifiesta en los equinos deportivos por alteraciones como anorexia, pérdida de peso, trastornos cutáneos, constipación, halitosis, putrefacciones intestinales, timpanismos cecocólicos y flatulencias, que de no ser adecuadamente tratadas generan una astenia que determina una importante merma del rendimiento del equino.

Hepatofield ha demostrado, en las numerosas pruebas efectuadas con equinos, una elevada eficacia para resolver los problemas de colestasis en el 92% de los casos, observándose una inmediata y completa remisión clínica de los signos, a no más de 5 días de iniciado el tratamiento.

INDICACIONES:

Desintoxicante hepático oral, indicado en insuficiencia hepática intoxicaciones medicamentosas, falta de apetito, sobreentrenamiento y activación de la función hepática.

ESPECIES:

Equinos deportivos y de trabajo no destinados al consumo humano.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

Grandes animales: Administrar 25 ml 1 o 2 veces al día, durante 10 días consecutivos.

Pequeños animales: Administrar 0.5 ml por cada 10 kg P.V. 1 o 2 veces al día, durante 10 días consecutivos.

La duración del tratamiento puede continuarse hasta 4 semanas, según necesidad e indicación del Médico Veterinario.

AGITAR ANTES DE USAR.

Efectos adversos y contraindicaciones:

Puede producir ablandamiento excesivo de las heces, en cuyo caso con la sola suspensión del producto recuperan su consistencia normal.

FÓRMULA

Tintura de alcachofa.....	40 ml
Tintura de boldo.....	40 ml
Tintura de carqueja.....	40 ml
DL Metionina.....	12 g
Sorbitol 70%.....	500 g
Agentes de formulación c.s.p.....	1000 ml



Presentación: 1000 ml y 100 ml

NABOLIC STRONG

BENEFICIOS

Nabolic Strong es un anabólico inyectable a base de estanozolol, especialmente diseñado para caninos y equinos de alta competición. Su alta concentración (50 mg por cada ml) le confiere un elevado poder anabólico y permite ampliar el intervalo de tiempo entre aplicaciones. Se caracteriza por una muy elevada capacidad anabólica y la más baja capacidad androgénica entre todos los anabólicos esteroides, característica que lo posiciona entre los mejores anabólicos. Tiene un pronunciado efecto de estimulación del metabolismo. El fármaco incrementa la retención de nitrógeno y minerales y una mejor utilización de la dieta proteica. Se ha comprobado una disminución del nitrógeno excretado con la orina, lo que indica un incremento de la síntesis proteica que da como resultado un mayor desarrollo muscular. Asimismo estimula la formación de tejido óseo. El resultado conjunto se traduce en un notable mejoramiento del aspecto general y condiciones del animal sin excitar el sistema nervioso central, lográndose resultados altamente satisfactorios. La forma de microcristales del estanozolol prolonga su actividad una vez administrado.

INDICACIONES:

Nabolic Strong está indicado para la recuperación de organismos deteriorados por edad avanzada, enfermedades y convalecencia de las mismas, injurias traumáticas o por trabajo excesivo. Es útil aliado en casos de fracturas, afecciones ortopédicas, distrofias musculares y deficiencias óseas en general. También está indicado como estimulante del apetito y para incrementar la potencia y la vitalidad.

En animales debilitados con condiciones físicas disminuidas, casos de geriatría, osteoporosis, para acelerar la recuperación en casos de cirugía, injurias traumáticas, distrofias musculares, afecciones ortopédicas, reparación de fracturas y deficiencias óseas en general. En la recuperación de animales con anemias crónicas, especialmente las aplásicas, por producción de eritropoyetina tanto renal como extrarrenal.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Caninos: 0,04 a 0,2 ml k.p.v. (2 a 10 mg de estanozolol por k.p.v.)

Equinos: 1 ml por cada 100 k.p.v. (50 mg de estanozolol por cada 100 k.p.v.) a intervalo semanal o 2 ml por cada 100 k.p.v. (100 mg de estanozolol por cada 100 k.p.v.) cada 15 días. El tratamiento podrá continuarse durante 4 semanas o según criterio del Médico Veterinario. En tratamientos clínicos muchos animales no requieren más de una o dos dosis para obtener los resultados terapéuticos esperados.

Nabolic Strong debe ser aplicado exclusivamente por vía intramuscular profunda, realizando prueba de aspiración para asegurarse de evitar la vía endovenosa. AGITAR antes de usar, para lograr homogenización del contenido. Para mejor aprovechamiento del producto se recomienda el uso concomitante con **Aminoácidos Vit** para favorecer la síntesis de proteínas.



Presentación: 50 ml

FÓRMULA

Estanozolol micronizado.....5 g
Agentes de formulación c.s.p.....100 ml

Recomendaciones:

No administrar a hembras gestantes.
No administrar en casos de tumoraciones malignas de cualquier etiología.
No administrar junto con hormonas adrenocorticotróficas y corticoides.
No sobredosificar.