




CHINFIELD

AMINOÁCIDOS VIT

BENEFICIOS:

Aminoácidos Vit aporta los aminoácidos esenciales para mantener o restaurar el nivel proteico adecuado, las vitaminas indispensables para el aprovechamiento de los mismos y los electrolitos necesarios para asegurar la isotonía.

INDICACIONES:

Deshidratación de cualquier origen (diarreas, poliuria, hepatopatías, sudoración intensa), intoxicaciones, estados de agotamiento físico, estado de estrés, hemorragias, pérdida de electrolitos, hipoproteinemias, convalecencias, inapetencia y sobreentrenamiento.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Equinos:

Inyección endovenosa **LENTA**: 0,1 a 0,5 ml por cada kg P.V.

Oral: 0,15 a 0,7 ml por cada kg P.V.

Bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos y porcinos:

Inyección endovenosa **LENTA**, intramuscular o subcutánea:
0,1 a 0,5 ml por cada kg P.V.

Oral: Hasta 2 meses de edad.

0,15 a 0,7 ml por cada kg P.V.

Caninos y felinos:

Inyección endovenosa lenta, intramuscular o subcutánea:

0,1 a 0,3 ml por cada kg P.V.

Oral: 0,15 a 0,4 ml por cada kg P.V.

Intervalo entre dosis para todas las especies:

Según criterio del Médico Veterinario.

FÓRMULA:

Arginina.....	300 mg	Pantotenato de Calcio.....	1000 mg
Fenilalanina.....	100 mg	Vitamina B1 (clorhidrato).....	50 mg
Histidina clorhidrato.....	50 mg	Vitamina B2 (fosfato).....	10 mg
Leucina.....	75 mg	Vitamina B6 (clorhidrato).....	25 mg
Triptófano.....	50 mg	Vitamina B12.....	1.000 ug
Treonina.....	50 mg	Vitamina C.....	300 mg
Valina.....	100 mg	Cloruro Sodio.....	900 mg
Cisteína (clorhidrato).....	100 mg	Cloruro potasio.....	100 mg
Lisina (clorhidrato).....	500 mg	Cloruro de magnesio.....	50 mg
Glicocola.....	1000 mg	Cloruro de cobalto.....	10 mg
Metionina.....	400 mg	Citrato de sodio.....	100 mg
Nicotinamida.....	200 mg	Sorbitol.....	5000 mg
		Agentes de formulación c.s.p.....	100 ml



Presentación: 250 ml

ANTILIS

BENEFICIOS:

Antilis es una medicación de potente y efectiva acción espasmolítica, miorrelajante y analgésica, especialmente adaptada para el equino deportivo, cuya acción se centra en las estructuras anatómicas de fibra lisa, innervadas por el sistema neurovegetativo, tracto gastroentérico, colédoco, vías urinarias y útero.

Con su administración, los cólicos espasmódicos ceden rápidamente y por lo general en forma total y definitiva, con la pronta recuperación del animal. Comúnmente, este resultado se logra con la primera dosis, aunque si es necesario, puede repetirse el tratamiento 1 o 2 horas después de la primera administración.

INDICACIONES:

Cólicos espasmódicos gastrointestinales y post-quirúrgicos, espasmos cervicales, uterinos y de las vías urinarias (litiasis renal), partos distócicos y algias de los órganos de fibra lisa.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos y caninos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración:

Equinos:

Intramuscular

Inyección endovenosa **LENTA**.

Equinos adultos: Aplicar 10 ml

Potros: Aplicar 2 ml por cada 100 kg P.V.

Repetir a las 4 o 6 hrs, según recomendación del Médico Veterinario.

Vía de administración:

Caninos:

Subcutánea

Intramuscular

Inyección endovenosa **LENTA**.

Aplicar 0.5 ml por cada 10 kg P.V.

Repetir cada 24 hrs según recomendación del Médico Veterinario.



Presentación: 10 ml

FÓRMULA:

N-Butilbromuro Hioscina.....	1 g
Papaverina (clorhidrato).....	1 g
Dipiróna sódica (monohidrato).....	25 g
Agentes de formulación c.s.p.....	100 ml

ANTIISTAMÍNICO

BENEFICIOS:

Los procesos alérgicos afectan a los diferentes órganos y tejidos y se manifiestan con la sintomatología más variada, que puede ir desde una simple dermatopatía hasta el shock mortal.

Antihistamínico Chinfield tiene como principio activo un antihistamínico potente y de amplio espectro, efectivo para reducir y eliminar cualquier reacción alérgica. También tiene acción preventiva, por lo cual es aconsejable su uso cuando se prevé una reacción de este tipo. Administrado en las dosis que se indica, **Antihistamínico Chinfield** es inocuo y casi por completo carente de reacciones secundarias, lo que permite su uso cada vez que sea necesario.

INDICACIONES:

Procesos alérgicos de cualquier etiología y localización y en todos los casos en que está indicada una medicación antihistamínica.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Equinos, bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos y porcinos: 1 a 2 ml por cada 100 kg P.V., cada 6, 8, 12 o 24 hrs según recomendación del Médico Veterinario.

Caninos y felinos:

0.2 a 0.4 ml por cada kg P.V.

Caninos: cada 8, 12 o 24 hrs según la recomendación del Médico Veterinario.

Felinos: cada 12 o 24 hrs según la recomendación del Médico Veterinario.

Vía endovenosa o intramuscular según la urgencia y recomendación del Médico Veterinario.

FÓRMULA:

Clorhidrato de Difenhidramina1000 mg
Agentes de formulación c.s.p.100 ml



Presentación: 50 ml

AMINOSUC

BENEFICIOS:

Aminosuc es una asociación de vitaminas y minerales esenciales integrados con aminoácidos, que constituyen un suplemento alimenticio, especialmente adaptado para complementar la ración del animal. Su administración durante 10 días consecutivos, garantiza un perfecto equilibrio alimenticio, que suple todas las exigencias dietéticas del animal y le permite aprovechar al máximo el valor calórico y de reposición de la ración.

INDICACIONES:

Hipovitaminosis, pérdida de peso, animales en crecimiento, raquitismo, convalecencia, entrenamiento, animales físicamente disminuidos por edad, enfermedad, preñez y lactancia. Para llevar al animal a óptimas condiciones de rendimiento y salud.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Equinos y bovinos: Suministrar 10 ml por cada 100 kg P.V. o 1 ml por cada 10 kg P.V. una o dos veces por día directamente en la boca, durante 10 días seguidos y 20 días de descanso según el requerimiento del animal o indicación del Médico Veterinario. En animales muy disminuidos, administrar durante 20 a 30 días seguidos.

Porcinos, caprinos, ovinos, aves, caninos y felinos: 1 ml por cada 10 kg P.V. 1 o 2 veces por día directamente en la boca, durante 10 días seguidos y 20 días de descanso según el requerimiento del animal o indicación del Médico Veterinario. En animales muy disminuidos, administrar durante 20 a 30 días seguidos.

FÓRMULA:

Vitamina A.....	150000 UI
Vitamina B1 clorhidrato.....	750 mg
Vitamina B2 fosfato.....	150 mg
Vitamina B6 clorhidrato.....	120 mg
Vitamina B12.....	5000 ug
Vitamina B13.....	75 mg
Vitamina B15.....	10 mg
Vitamina C.....	5000 mg
Vitamina D2.....	200000 UI
Vitamina E.....	150 mg
Vitamina H.....	1 mg
Nicotinamida.....	500 mg
Pantotenato de Calcio.....	150 mg
Acido Fólico.....	5 mg

Aminoácidos (caseína).....	20.000 mg
Metionina.....	500 mg
Lisina.....	500 mg
Fosfato Tricálcico.....	20.000 mg
Hidróxido de Magnesio.....	10.000 mg
Sulfato Ferroso.....	2.000 mg
Cloruro de Cobalto.....	150 mg
Sulfato de Cobre .5H2O.....	75 mg
Sulfato de Manganeseo.....	100 mg
Sulfato de Zinc.....	50 mg
Ioduro de Potasio.....	750 mg
Cloruro de Sodio.....	5.000 mg
Lecitina.....	5.000 mg
Agentes de formulación c.s.p.....	1.000 ml



AGITAR ANTES DE USAR

Presentación: 1000 ml y 120 ml

ATP DINAMÓGENO

BENEFICIOS:

ATP Dinamógeno estimula el trabajo muscular por mecanismos bioquímicos y mantiene una reserva energética adecuada por más tiempo durante la prueba, permitiendo que la aparición de la fatiga tenga un retardo, con el consiguiente beneficio que ello implica.

INDICACIONES:

Energizante muscular, indicado en caso de distrofias, dolores musculares y siempre que se necesite aumentar el nivel de trabajo muscular, agotamiento físico y sobreentrenamiento.

ATP Dinamógeno funciona como tónico neuromuscular.

ESPECIES:

Equinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Aplicar 2 ml por cada 100 kg P.V. (10 ml para un Equino de 500 kg P.V.) cada 24 o 48 horas, en series de 5 a 10 aplicaciones o según indicación del Médico Veterinario. Inyección por vía endovenosa **LENTA**. Con una jeringa estéril trasladar el solvente al frasco del polvo y agitar hasta disolver.

Efectos adversos y contraindicaciones:

Una vez preparada la solución, conservar refrigerada por no más de 8 días. No mezclar con otros medicamentos. No congelar.

FÓRMULA:

Frasco N° 1 (Polvo)

ATP.....	800 mg
Glutación reducido.....	500 mg
Glucosa pura anhidra.....	700 mg

Frasco N° 2 (Diluyente)

Vitamina B15.....	20 mg
Agentes de formulación c.s.p.....	50 ml

Presentación:

Estuche con 1 frasco ampolla polvo 2 g y 1 frasco ampolla diluyente 50 ml



ANARTRÍTICO

BENEFICIOS:

Anartrítico Chinfield actúa sobre la secuencia inflamación-dolor-espasmo a nivel óseo, muscular y sinovial rompiendo en sus tres puntos el círculo vicioso típico de esta serie. De este modo, la medicación del estado reumático no solo es sintomática sino también curativa, desapareciendo el dolor, la inflamación y recuperando la movilidad tendoarticular. Paralelamente reduce al mínimo, la posibilidad de nuevos episodios y elimina las secuelas.

La monofenilbutazona es el derivado butazónico de mayor actividad antiflogística, a la vez que presenta el máximo de tolerancia. Actúa directamente sobre el foco inflamatorio reduciendolo paulatinamente y restaurando la normalización tisular.

La dexametasona (en forma de sal soluble) actúa sinérgicamente con la monofenilbutazona en la eliminación del foco inflamatorio-doloroso, reduce el edema local y reestablece el equilibrio de la bioquímica celular.

El clorhidrato de orfenadrina, es un compuesto dotado de una potente acción anticolinérgica, que ayuda a resolver rápidamente el espasmo muscular, que acompaña generalmente a los procesos reumáticos evitando que se agrave el cuadro. La orfenadrina pertenece a un grupo de fármacos que relajan el músculo esquelético. Actúa cambiando la forma en que el cuerpo percibe el dolor muscular; inhibe la rigidez y el temblor.

El clorhidrato de lidocaína, es un anestésico local que al ser aplicado por vía endovenosa se transforma en un potente analgésico que alivia el dolor general y/o post-operatorio teniendo gran eficacia en dolores neuropáticos.

INDICACIONES:

Reumatismo (de cualquier origen y localización), artritis, osteoartritis, artrosis, procesos inflamatorios (agudos y crónicos), distensiones, espasmos musculares, infosura y laminitis.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Aplicar 4 ml por cada 100 kg P.V. diario o interdiario o según indicación del Médico Veterinario.

Inyección por vía endovenosa **LENTA**.

FÓRMULA:

Monofenilbutazona.....	12,5 g
Orfenadrina (clorhidrato).....	500 mg
Dexametasona 21 (fosfato sódico).....	25 mg
Lidocaína (clorhidrato).....	200 mg
Agentes de formulación c.s.p.....	100 ml



Presentación: 100 ml

B-12 50.000 mcg

BENEFICIOS

La vitamina B12 es un potente antianémico que actúa aumentando el número de glóbulos rojos hasta el valor normal. Es un neurotónico muy efectivo que contribuye a la solución de problemas de neuritis, neuralgias, mialgias y otros trastornos neurológicos. Estas cualidades lo hacen muy eficiente en la recuperación de animales sometidos a sobreentrenamiento, convalecientes de enfermedades orgánicas, infecciosas o parasitarias.

INDICACIONES:

Anemias de cualquier tipo (disminución del número de glóbulos rojos), procesos neurológicos (neuralgias y neuritis), convalecencias, debilidad, tónico inespecífico para ayudar a la recuperación de animales decaídos.

ESPECIES:

Equinos, bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar 0,5 ml a 1 ml por cada 50 k.p.v. cada 48 hrs o según indicación del Médico Veterinario.

Inyección intramuscular o endovenosa **LENTA**.

Efectos adversos y contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto.

No presenta efectos adversos usando la dosis recomendada.

FÓRMULA

Vitamina B12 (cianocobalamina).....50000 mcg

Agentes de formulación c.s.p.....50 ml



Presentación: 50 ml

BATACAS

BENEFICIOS

El trabajo del Equino es casi exclusivamente muscular y de gran esfuerzo. Por ello el animal está constantemente expuesto a problemas músculo-esqueléticos que se manifiestan en forma de cansancio, contracturas, calambres y dolores que disminuyen significativamente el rendimiento. **Batacas** es un poderoso relajante y tónico muscular. Actúa selectivamente sobre el sistema nervioso central disminuyendo la hiperactividad del músculo estriado, produciendo relajación pero sin alterar el tono normal del mismo, rompiendo así el círculo vicioso contractura-dolor-contractura, facilitando y aumentando la irrigación sanguínea, la oxigenación y acelerando la eliminación de metabolitos, poniendo al animal en óptimas condiciones y en la plenitud de sus fuerzas.

El clorhidrato de orfenadrina, es un compuesto dotado de una potente acción anticolinérgica, que ayuda a resolver rápidamente el espasmo muscular que acompaña generalmente a los procesos reumáticos evitando que se agrave el cuadro. Se usa con reposo, fisioterapia y otras medidas para aliviar el dolor y la incomodidad causados por distensiones, esguinces y otras lesiones musculares. La orfenadrina pertenece a un grupo de fármacos que relajan el músculo esquelético. Actúa cambiando la forma en que el cuerpo percibe el dolor muscular; inhibe la rigidez y el temblor.

El aspartato de magnesio es una combinación del aminoácido ácido aspártico con el mineral magnesio en su forma quelada. El ácido aspártico incrementa la absorción, circulación y utilización del magnesio y de otros minerales como el calcio, zinc y potasio si se combina con ellos. También protege el sistema cardiovascular y participa en multitud de funciones metabólicas y celulares.

INDICACIONES:

Batacas es indicado en animales sometidos a esfuerzos físicos por entrenamiento, competencias, trabajo exigente. Se usa para acortar el tiempo de recuperación en animales con dolores musculares localizados o generalizados, contracturas, envaramiento, sobreentrenamiento y miositis.

ESPECIES:

Equinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Preventivo: 1 ml por cada 100 k.p.v. durante 3 a 5 días seguidos o según criterio del Médico Veterinario.

Curativo: 2 ml por cada 100 k.p.v. durante 3 a 5 días seguidos o según criterio del Médico Veterinario.

Inyección exclusiva por vía endovenosa **LENTA**.

Efectos adversos y contraindicaciones:

Puede presentarse tos después de la aplicación.

Hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto. Se puede observar midriasis, disminución de la secreción salival y por su efecto parasimpaticolítico puede producir leve incremento de la frecuencia cardíaca.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:	
Orfenadrina (clorhidrato).....	2000 mg
Aspartato de Magnesio.....	1890 mg
Vitamina B6.....	2500 mg
Vitamina B15.....	2500 mg
Agentes de formulación c.s.p.....	100 ml



Presentación: 50 ml

CIPROHEPTADINA

BENEFICIOS

Ciproheptadina Chinfield es un jarabe que aumenta el apetito, favorece el desarrollo muscular, estimula la función hepática y la secreción de los jugos digestivos actuando como tónico general. Levanta en breve tiempo animales caídos, debilitados o convalecientes. No interfiere con otros tratamientos y está indicado cuando se administran vitaminas, hepatoprotectores y antianémicos.

INDICACIONES:

Estimulante del apetito, indicado en anorexia, avitaminosis, pérdida de peso, falta de desarrollo, inapetencias, convalecencias y debilidad muscular.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equinos, bovinos: Vía oral, 10 ml por cada 100 kg P.V.

Caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos, aves y conejos: Vía oral, 1 ml por cada 10 kg P.V.

Se recomienda administrar 2 horas antes de la ración, puro, directamente en la boca, durante 20 días consecutivos o según indicación del Médico Veterinario.

Refrigerar después de abierto.

FÓRMULA

Cada 1000 ml contiene:

Ciproheptadina (clorhidrato).....	1g
Lisina (clorhidrato).....	100 g
Betaina (clorhidrato).....	30 g
Vitamina B12.....	20 mg
Agentes de formulación c.s.p.....	1000 ml



Presentación: 1000 ml y 100 ml

COAGULANTE

BENEFICIOS

Coagulante Chinfield cubre todo el cuadro de hemorragias de cualquier etiología y localización, gracias a los dos componentes activos de su formulación. Se administra cuando se produce un derrame sanguíneo, se obtiene rápidamente la detención completa de la efusión hemática y si se administra preventivamente, se consigue evitar la pérdida de sangre.

Al inyectarlo una hora antes de cualquier intervención quirúrgica, se tendrá un campo operatorio más claro y se facilita de esta manera la maniobra operatoria. La vitamina K por su inherencia en la formación de protrombina, y la ciclonamina acelerando la transformación de protrombina en trombina, prolonga significativamente el tiempo de actividad del producto.

INDICACIONES:

Prevención y tratamiento de hemorragias de cualquier etiología y localización.



Presentación: 10 ml

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equino – Bovinos: 2 a 4 ml por cada 100 k.p.v. o según criterio del Médico Veterinario.

Caninos – Felinos: 0,25 a 1,5 ml por cada 100 k.p.v. según el tamaño del animal o según criterio del Médico Veterinario.

Repetir 1 o 2 veces por día hasta que cese la hemorragia.

Inyección endovenosa **LENTA** o intramuscular **LENTA**.

Intervalo entre dosis: Mínimo 12 horas o según criterio del Médico Veterinario.

Efectos adversos y contraindicaciones:

En caso de inyección endovenosa rápida puede producir leve hipotensión transitoria. Si se produjeran coágulos intravasculares, utilizar drogas como sulfonilureas (tolbutamida, clorpropamida), a efectos de mejorar la actividad fibrinolítica.

ANTAGONISTAS FARMACOLÓGICOS:

Cumarina y warfarina.

Precauciones:

Condiciones de asepsia y antisepsia para inyección parenteral.

No mezclar con otros productos en la misma jeringa.

No exceder los 10 ml por punto de aplicación intramuscular, en estos casos, repartir en dos lugares.

FÓRMULA

Ciclonamina.....	15 g
Vitamina K1.....	50 mg
Agentes de formulación c.s.p.....	100 ml

DIURETIC

BENEFICIOS

Existe una entidad fisiopatológica caracterizada por la retención de agua en distintos tejidos, el edema, cuya medicación de fondo se basa fundamentalmente en la eliminación de ese exceso de agua, por vía renal mediante fármacos que aumenten la diuresis, los denominados diuréticos.

Diuretic aumenta significativamente la eliminación de agua por vía renal (acción renotrópica) y lo que es más importante para el tratamiento del edema, la eliminación de sodio por la misma vía, ya que el agua le sigue pasivamente por acción osmótica. **Diuretic** es uno de los diuréticos-saluréticos más potentes. Con su administración se logra eliminar en breve tiempo el edema y sus efectos concomitantes, manteniendo en un nivel bajo la eliminación de potasio. La potente actividad de este fármaco permite manejar la diuresis en la forma necesaria, adecuando la dosis a administrar según lo aconseje la gravedad y evolución de la enfermedad.



Presentación: 10 ml

INDICACIONES:

Edemas de cualquier etiología y localización: de ubre pre y postparto, renal, cerebral, cardíaco, pulmonar, por obstrucción vascular, hipertensión arterial, hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio (HPIE).

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos, felinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Administrar por inyección endovenosa o intramuscular según necesidad o urgencia.

Equinos y Bovinos:

0,4 a 1,2 ml por cada 100 k.p.v. (20 a 60 mg de furosemida).

Caninos y Felinos: 0,04 a 0,1 ml por cada k.p.v. (2 a 5 mg de furosemida).

1 a 3 veces por día, según criterio del Médico Veterinario.

Incompatibilidades:

Anfotericina B: Su uso conjunto puede producir hipopotasemia.

Glucósidos Digitálicos: Puede aumentar la posibilidad de intoxicación digitálica asociada a hipopotasemia.

Acido Acetilsalicílico: En casos de hipoprotobinemia.

Teofilina: Por potenciación de su efecto.

Fenilbutazona: Disminución del efecto diurético por inhibición de prostaglandina de origen renal.

SOBREDOSIFICACION:

En caso de una sobredosificación accidental, suspender la administración del fármaco y reestablecer el equilibrio hidroelectrolítico inmediatamente.

DL 50 en perros 400 mg por cada k.p.v. por vía endovenosa.

FÓRMULA

Furosemida.....5000 mg
Excipientes c.s.p.....100 ml

FUROFIELD

BENEFICIOS

La furosemida aumenta significativamente la eliminación de agua por vía renal (acción renotrópica) y lo que es más importante para el tratamiento del edema, la eliminación de sodio por la misma vía, ya que el agua le sigue pasivamente por acción osmótica. Con su administración se logra eliminar en breve tiempo el edema y sus efectos concomitantes, manteniendo en un nivel bajo la eliminación de potasio. La potente actividad de este fármaco permite manejar la diuresis en la forma necesaria, adecuando la dosis a administrar según lo aconseje la gravedad y evolución de la enfermedad.

Diurético y anti-inflamatorio que promueve la excreción del cloro y potasio. Su efecto diurético es independiente del estado de equilibrio ácido básico del paciente. La dexametasona posee una actividad antiinflamatoria y antiestrés. La experiencia clínica demuestra que los edemas se ven notablemente disminuidos por este fármaco.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equinos, Bovinos, Ovinos y Caprinos: 2 a 5 ml por cada 100 k.p.v. cada 24 horas o a criterio del Médico Veterinario.
Caninos y Felinos: 0,25 a 0,5 ml por cada 5 k.p.v. con intervalo entre dosis de 12 o 24 horas o según criterio del Médico Veterinario.

El producto se aplicará en las dosis indicadas, por vía endovenosa **LENTA** o intramuscular.

Efectos adversos y contraindicaciones:

No aplicar en caso de infecciones sistémicas agudas (a menos que esté instaurada terapia antimicrobiana específica). Evitar vacunas de organismos atenuados. Tampoco debe utilizarse en pacientes con tuberculosis activa o dudosamente inactiva exceptuando cuando se utiliza en conjunción con drogas tuberculostáticas. No sobredosificar para evitar desequilibrios electrolíticos producidos por furosemida. No administrar a animales con trastornos renales agudos. No administrar a hembras en su tercer trimestre de gestación por la presencia de dexametasona que podría provocar inducción al parto prematuro no deseado. Un tratamiento prolongado puede provocar hipercorticismismo, así como la suspensión brusca del fármaco podría provocar hipocorticismismo.

INTERACCIONES:

Anfotericina B diuréticos depletors de Potasio: Su uso conjunto puede producir hipopotasemia.

Glucósidos Digitálicos: Puede aumentar la posibilidad de intoxicación digitalica asociada a hipopotasemia.

Acido Acetilsalicílico: En casos de hipoprotobinemia.

Teofilina: Por potenciación de su efecto.

Fenilbutazona: Disminución del efecto diurético por inhibición de prostaglandina de origen renal.

Isoniazida: Su efectividad antituberculosa puede disminuir por aumento del metabolismo hepático.

FÓRMULA

Furosemida.....5 g
 Dexametasona 21 fosfato.....0,2 g
 Agentes de formulación c.s.p.....100 ml



Presentación: 25 ml

GASINT

BENEFICIOS

Gasint disminuye la tensión superficial del contenido gastroentérico, de esta manera los gases formados se reúnen en burbujas grandes y son fácilmente expulsados. Puede ser empleado en el pre y post-operatorio en forma preventiva para eliminar la formación de gases o cuando aparecen los primeros síntomas de distensión abdominal o cólico.

INDICACIONES:

Sirve para trastornos gaseosos como meteorismos o timpanismos, producción y retención de gases en todo el tracto gastroentérico, pre y post-operatorio abdominal, acetonemias, previene lesiones e insuficiencias hepáticas como consecuencia de intoxicaciones alimentarias.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, ovinos y caprinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equinos y Bovinos: 100 ml en el momento en que empiezan las molestias. Si es necesario, repetir dosis cada 2 a 4 horas. Como profiláctico en pre-operatorio, aplicar 100 ml 8 horas antes de la operación.

Ovinos y Caprinos:

Animales pequeños: 10 a 20 ml.

Animales grandes: 40 a 50 ml.

Exclusivamente inyección endovenosa **RÁPIDA**.

FÓRMULA

Sorbitol.....50 g
Agentes de formulación c.s.p.....100 ml

Efectos adversos y contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto.
No usar en los casos de enfermedades hepáticas severas, insuficiencias cardíacas o renales, deshidratación y diarrea.
No se han observado efectos adversos si se administran en forma indicada. En caso de sobredosis administrar Atropina.



Presentación: 100 ml

HEMOFIELD

BENEFICIOS

Hemofield es un antianémico y antineurítico eficaz para lograr rápida recuperación en anemias no ferropénicas. La eficiente combinación en su fórmula del ácido fólico, fundamental en la síntesis del ácido desoxirribonucleico y por lo tanto de la eritropoyesis lo que lo convierte en un factor esencial de crecimiento y maduración eritrocítica, junto a vitamina B12, la vitamina "antianémica" y vitamina B1, la vitamina antineurítica por excelencia, hacen de **Hemofield** la elección cuando baja el rendimiento del animal sin causas aparentes que lo justifiquen, cuando se sospecha sobreentrenamiento o cuando el hemograma arroja valores subnormales en el recuento de glóbulos rojos.

INDICACIONES:

Animales expuestos a enfermedades infecciosas o parasitarias anemizantes.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos, bovinos, caprinos, ovinos y caninos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Equinos y bovinos en crecimiento:

2,5 ml por cada 100 k.p.v. diarios.

Equinos y bovinos adultos: 10 ml diarios.

Caninos, caprinos y ovinos:

1 ml por cada 25 k.p.v. diarios.

Aplicar por vía endovenosa **LENTA** (de elección). También se puede aplicar por vía intramuscular.

FÓRMULA

Ácido Fólico.....	0,1 g
Vitamina B1.....	10 g
Vitamina B12.....	0,2 g
Agentes de formulación c.s.p.....	100 ml



Presentación: 50 ml

HEPATO FACTOR A

BENEFICIOS

Hepato Factor A, por la adecuada combinación de sus principios activos, normaliza, estimula y protege el funcionamiento hepático en todos sus aspectos: desintoxicante, lipometabolizador, proteinogénico y antianémico. Este estímulo total de la función hepática subsiste después de terminado el tratamiento, porque desencadena mecanismos biológicos que, una vez puestos en marcha, se mantienen normalmente por mucho tiempo. Este producto posee propiedades hepatoprotectoras, lipotrópicas y desintoxicantes.

INDICACIONES:

Indicado en insuficiencias hepáticas, intoxicaciones medicamentosas o alimenticias, convalecencias de enfermedades infecciosas y parasitarias, falta de apetito, training y sobreentrenamiento.

ESPECIES:

Equinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar 10 ml a 15 ml diarios por equino durante no menos de tres días o según indicación del Médico Veterinario.

Exclusivamente inyección endovenosa **LENTA**.

FÓRMULA

DL-N-Acetil-Homocisteína-Tiolactona.....	500 mg
Acetil-metionina cálcica.....	5 g
Glicocola.....	5 g
Vitamina B12.....	2000 µg
Glucosa pura anhidra.....	40 g
Excipientes c.s.p.....	100 ml

Presentación: 100 ml

HEPATOFIELD

BENEFICIOS

Los equinos, son animales expuestos a alto nivel de estrés por el exigente entrenamiento al que son sometidos. Por su casi permanente encierro y por los diferentes tratamientos que reciben, frecuentemente dan como resultado problemas hepáticos de tipo colestático debido a obstrucciones del drenaje biliar, congestiones e inflamaciones intestinales, cólicos e intoxicaciones de origen exógeno o endógeno.

El síndrome de colestasis se manifiesta en los equinos deportivos por alteraciones como anorexia, pérdida de peso, trastornos cutáneos, constipación, halitosis, putrefacciones intestinales, timpanismos cecocólicos y flatulencias, que de no ser adecuadamente tratadas generan una astenia que determina una importante merma del rendimiento del equino.

Hepatofield ha demostrado, en las numerosas pruebas efectuadas con equinos, una elevada eficacia para resolver los problemas de colestasis en el 92% de los casos, observándose una inmediata y completa remisión clínica de los signos, a no más de 5 días de iniciado el tratamiento.

INDICACIONES:

Desintoxicante hepático oral, indicado en insuficiencia hepática intoxicaciones medicamentosas, falta de apetito, sobreentrenamiento y activación de la función hepática.

ESPECIES:

Equinos deportivos y de trabajo no destinados al consumo humano.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

Grandes animales: Administrar 25 ml 1 o 2 veces al día, durante 10 días consecutivos.

Pequeños animales: Administrar 0.5 ml por cada 10 kg P.V. 1 o 2 veces al día, durante 10 días consecutivos.

La duración del tratamiento puede continuarse hasta 4 semanas, según necesidad e indicación del Médico Veterinario.

AGITAR ANTES DE USAR.

Efectos adversos y contraindicaciones:

Puede producir ablandamiento excesivo de las heces, en cuyo caso con la sola suspensión del producto recuperan su consistencia normal.

FÓRMULA

Tintura de alcachofa.....	40 ml
Tintura de boldo.....	40 ml
Tintura de carqueja.....	40 ml
DL Metionina.....	12 g
Sorbitol 70%.....	500 g
Agentes de formulación c.s.p.....	1000 ml



Presentación: 1000 ml y 100 ml

**CHINFIELD**

MV CHINFIELD

BENEFICIOS

MV Chinfield actúa estimulando directamente el centro respiratorio y el grado de saturación de la hemoglobina, lo que deriva en un defatigante. Aumenta el volumen de aire inspirado en forma progresiva, y su efecto dura varias horas. No se han verificado reacciones secundarias con su uso prolongado y se puede administrar cuantas veces sea necesario sin producir acostumbramiento siempre con indicación del Médico Veterinario.

INDICACIONES:

Estimulante cardiorrespiratorio, defatigante y broncodilatador indicado en casos de anoxia cardíaca, depresión respiratoria y para cuando se desee aumentar el volumen de aire inspirado. También se usa para reducir la fatiga producida por el mayor esfuerzo físico. Funciona como coadyuvante de tratamientos para evitar hemorragias de esfuerzo (hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio).

MV Chinfield también está indicado en casos de reacciones alérgicas respiratorias por cama de paja, viruta y diversos alérgenos del establo que pueden aparecer en caballos sensibles.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar 10 ml una o más veces por día o según indicación del Médico Veterinario. Exclusivamente inyección endovenosa **LENTA**.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos.

FÓRMULA

Succinato de sodio	20 g
UTP	200 mg
Excipientes c.s.p.....	100 ml



Presentación: 50 ml

CHINFIELD

NABOLIC STRONG

BENEFICIOS

Nabolic Strong es un anabólico inyectable a base de estanozolol, especialmente diseñado para caninos y equinos de alta competición. Su alta concentración (50 mg por cada ml) le confiere un elevado poder anabólico y permite ampliar el intervalo de tiempo entre aplicaciones. Se caracteriza por una muy elevada capacidad anabólica y la más baja capacidad androgénica entre todos los anabólicos esteroides, característica que lo posiciona entre los mejores anabólicos. Tiene un pronunciado efecto de estimulación del metabolismo. El fármaco incrementa la retención de nitrógeno y minerales y una mejor utilización de la dieta proteica. Se ha comprobado una disminución del nitrógeno excretado con la orina, lo que indica un incremento de la síntesis proteica que da como resultado un mayor desarrollo muscular. Asimismo estimula la formación de tejido óseo. El resultado conjunto se traduce en un notable mejoramiento del aspecto general y condiciones del animal sin excitar el sistema nervioso central, lográndose resultados altamente satisfactorios. La forma de microcristales del estanozolol prolonga su actividad una vez administrado.

INDICACIONES:

Nabolic Strong está indicado para la recuperación de organismos deteriorados por edad avanzada, enfermedades y convalecencia de las mismas, injurias traumáticas o por trabajo excesivo. Es útil aliado en casos de fracturas, afecciones ortopédicas, distrofias musculares y deficiencias óseas en general. También está indicado como estimulante del apetito y para incrementar la potencia y la vitalidad.

En animales debilitados con condiciones físicas disminuidas, casos de geriatría, osteoporosis, para acelerar la recuperación en casos de cirugía, injurias traumáticas, distrofias musculares, afecciones ortopédicas, reparación de fracturas y deficiencias óseas en general. En la recuperación de animales con anemias crónicas, especialmente las aplásicas, por producción de eritropoyetina tanto renal como extrarrenal.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Caninos: 0,04 a 0,2 ml k.p.v. (2 a 10 mg de estanozolol por k.p.v.)

Equinos: 1 ml por cada 100 k.p.v. (50 mg de estanozolol por cada 100 k.p.v.) a intervalo semanal o 2 ml por cada 100 k.p.v. (100 mg de estanozolol por cada 100 k.p.v.) cada 15 días. El tratamiento podrá continuarse durante 4 semanas o según criterio del Médico Veterinario. En tratamientos clínicos muchos animales no requieren más de una o dos dosis para obtener los resultados terapéuticos esperados.

Nabolic Strong debe ser aplicado exclusivamente por vía intramuscular profunda, realizando prueba de aspiración para asegurarse de evitar la vía endovenosa. AGITAR antes de usar, para lograr homogenización del contenido. Para mejor aprovechamiento del producto se recomienda el uso concomitante con **Aminoácidos Vit** para favorecer la síntesis de proteínas.



Presentación: 50 ml

FÓRMULA

Estanozolol micronizado.....5 g
Agentes de formulación c.s.p.....100 ml

Recomendaciones:

No administrar a hembras gestantes.
No administrar en casos de tumoraciones malignas de cualquier etiología.
No administrar junto con hormonas adrenocorticotróficas y corticoides.
No sobredosificar.

NEUROMAX 1.5%

BENEFICIOS

Neuromax 1.5% es un neurolítico empleado para producir la pronta inhibición temporal de la conducción nerviosa en las fibras amielínicas de tipo C, debido al ion amonio el cual actúa por competencia iónica, siendo su capacidad de producir bloqueo de transmisión, inversamente proporcional al grosor de la fibra nerviosa, variando en consecuencia la dosis a utilizar de acuerdo con el diámetro del nervio a tratar.

INDICACIONES:

Para el bloqueo reversible de fibras nerviosas amielínicas de tipo C, responsables de la conducción de los estímulos dolorosos. Neuralgias, mialgias, miositis, contracturas musculares, enfermedad degenerativa articular, bursitis, sinovitis y periostitis.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La dosificación depende de la zona a tratar:

Periostitis metacarpiana/metatarsiana dorsal y Osteitis intermetacarpiana/intermetatarsiana:
5 ml o más, de acuerdo con el criterio del Médico Veterinario.

Infiltraciones intramusculares:

5 ml por punto de inyección, estableciéndose una dosis de 50 ml total por la grupa, paleta, dorso y lomo. Se podrá aplicar con antiinflamatorios (corticoides) o anestésicos locales de acuerdo con el criterio del Médico Veterinario. Se puede repetir la dosificación tantas veces como sea necesario una vez desaparecidos los efectos de la aplicación anterior, ya que a diferencia de los neurolíticos a base de fenol, **Neuromax** no provoca fibrosis en el punto de inyección.

Aplicación Perineural:

Nervios digitales 2 a 4 ml.
Nervios palmares 3 a 5 ml.
Nervio peróneo superficial 3 ml.
Nervio peróneo profundo 5 a 7 ml.
Nervio tibial 5 a 7 ml.

En aplicación **perineural** se recomienda usarlo puro sin el agregado de otras sustancias (corticoides, anestésicos locales).

FÓRMULA

Cloruro de amonio.....1.5 g
Agentes de formulación c.s.p.....100 ml



Presentación: 100 ml

UTP DINAMOGENO

BENEFICIOS

La principal fuente de energía empleada en el trabajo muscular anaeróbico proviene de la degradación de la glucosa. Esta degradación se produce a través de un mecanismo bioquímico en el que intervienen fundamentalmente el ATP y el UTP, al que se agrega el glutatión reducido, que por su actividad como sistema redox, participa en la contracción muscular. **UTP Dinamógeno** facilita y activa el trabajo del músculo y, por consiguiente el animal puede utilizar todo su potencial de carrera, a la vez que mantiene una reserva energética que lo capacita para mantener constante el nivel de rendimiento durante toda la prueba.

INDICACIONES:

Estimulante total del músculo indicado en preparación inmediata para la prueba, sobreentrenamiento, agotamiento físico, antitóxico, tónico neuromuscular y siempre que se necesite elevar el nivel de trabajo.

ESPECIES DE DESTINO:

Equinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Exclusivamente inyección endovenosa **LENTA**, 10 ml por día (5 días consecutivos) previos a la prueba o según indicación del Médico Veterinario.

Efectos adversos y contraindicaciones:

No mezclar con otros medicamentos.

FÓRMULA

Frasco Nro.1: (POLVO 2 g)	
UTP.....	100 mg
ATP.....	600 mg
Glutatión reducido.....	600 mg
Glucosa anhidra c.s.p.....	2000 mg

Frasco Nro.2: (SOLVENTE 50 ml)	
Excipientes c.s.p.....	50 ml

Presentación:

Estuche con 1 frasco ampolla polvo 2 g y 1 frasco ampolla diluyente 50 ml



YODACALCIO B12 D

BENEFICIOS

Yodacalcio B12 D es una asociación de calcio con oligoelementos (cobre, cobalto, hierro, yodo y fósforo), vitamina D2 y B12 recomendados para el tratamiento de los estados carenciales del ganado bovino. También promueve la ganancia de peso, la resistencia a enfermedades, aumenta el porcentaje de preñez y favorece el crecimiento. Su composición tiene un alto impacto sobre la eficiencia del metabolismo intermedio favoreciendo al máximo el aprovechamiento de los nutrientes contenidos en la dieta del animal.

INDICACIONES:

Suplemento mineral vitamínico indicado cuando se necesite incrementar la provisión de minerales y vitaminas en casos de, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipotiroidismo, debilidad, paresia puerperal, disminución de fertilidad.

Coadyuvante en carencias minerales y vitamínicas durante: preñez, lactancia, crecimiento, engorde, convalecencias, pre-parto, pre-servicio, pre y post-destete. En coincidencia con desparasitaciones y vacunaciones. Disminuye la incidencia de retenciones placentarias.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar 1 a 2 ml por cada 50 k.p.v. podrá repetirse entre 15 y 45 días. De rutina se recomienda a intervalos de 30 días y en lo posible programar las aplicaciones estratégicamente. Inyección subcutánea, intramuscular o endovenosa **LENTA**.

Bovinos caídos por hipomagnesemia o hipocalcemia, aplicación endovenosa **LENTA** de hasta 50 ml por cada 100 k.p.v. o según criterio del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Gluconato de calcio.....	18,7 g
Hipofosfito de calcio.....	6 g
Edetato de sodio y cobalto.....	12,5 g
Edetato de sodio y cobre.....	15 g
Edetato de sodio y hierro.....	12,5 g
Edetato de sodio y manganeso.....	6,5 g
Edetato de sodio y zinc.....	1 g
Cloruro de magnesio.....	2,5 g
Ioduro de potasio.....	1 g
Vitamina B12.....	1500 ug
Vitamina D2.....	25000 UI
Agentes de formulación c.s.p.....	1000 ml



Presentación: 500 ml

**CHINFIELD**

YODACALCIO MG

BENEFICIOS

Importante aporte mineral para el normal funcionamiento de los distintos sistemas del organismo con oligoelementos esenciales, reforzado por una elevada concentración de magnesio, que lo hace un producto de elección en aquellas zonas en donde esta carencia adquiere particular importancia, sobre todo en los casos de manifestaciones agudas. Tiene un positivo impacto sobre el metabolismo intermedio favoreciendo al máximo el aprovechamiento de los nutrientes contenidos en la dieta. **Yodacalcio MG®** promueve la ganancia de peso, favorece los procesos reproductivos y el crecimiento.

INDICACIONES:

Suplemento mineral vitamínico indicado cuando se necesite incrementar la provisión de minerales y vitaminas en casos de hipomagnesemia, hipocalcemia, afeosforosis, hipotiroidismo, debilidad, paresia puerperal, disminución de fertilidad, coadyuvante en carencias minerales durante la preñez, lactancia, crecimiento, engorde, convalecencias, pre-parto y pre-servicio, pre y post-destete. En coincidencia con desparasitaciones y vacunaciones, previamente y durante el pastoreo, animales caídos por hipomagnesemia e hipocalcemia.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Bovinos: 2 a 4 ml por cada 100 k.p.v.

Porcinos: 1 a 2 ml por cada 20 k.p.v.

Ovinos: 1 a 2 ml por cada 20 k.p.v.

Caprinos: 1 a 2 ml por cada 20 k.p.v.

Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa **LENTA**. La dosis podrá repetirse entre 15 y 45 días, pero el intervalo podrá ser modificado según estado y criterio del Médico Veterinario. De rutina se recomienda intervalo de 30 días y en lo posible programar las aplicaciones estratégicamente.

Bovinos caídos por hipomagnesemia o hipocalcemia aplicación endovenosa **LENTA** de hasta 50 ml por cada 100 k.p.v. o según criterio del Médico Veterinario.

Equinos: 2 a 3 ml por cada 100 k.p.v. aplicar por vía endovenosa **LENTA** (de elección).

Intramuscular, repartida en dos lugares.

Equinos deportivos: dosificar cada 5 a 8 días.

Equinos de trabajo: podrá repetirse entre 15 y 45 días, pero el intervalo podrá ser modificado según estado y criterio del Médico Veterinario. De rutina se recomienda intervalo de 30 días y en lo posible programar las aplicaciones estratégicamente.



Presentación: 500 ml

FÓRMULA

Gluconato de calcio.....	18,70 g
Hipofosfito de calcio.....	6 g
Gluconato de magnesio.....	100 g
Cloruro de magnesio.....	2,50 g
Ioduro de potasio.....	1 g
Edetato de sodio y cobalto.....	2,40 g
Edetato de sodio y cobre.....	1,41 g
Edetato de sodio y hierro.....	1,21 g
Edetato de sodio y manganeso.....	0,22 g
Edetato de sodio y zinc.....	0,05 g
Vitamina B12.....	1500 ug
Vitamina D2.....	25000 UI
Agentes de formulación c.s.p.....	1000 ml

CHINFIELD